

Planter

Gennemgå vinterrapsen kritisk inden Kerbsprøjtning

Fra 1. november kan Kerb anvendes i vinterraps. Kerb bekæmper græsukrudt. Inden vinterrapsen sprøjtes med Kerb bør marken gennemgås grundigt for områder med stor bestand af væselhale og de bør ikke sprøjtes.

Nyhed | 29. oktober 2020



Det er fra 1. november muligt at anvende Kerb i vinterraps. Jordtemperaturen skal være under 10 grader. Kerb har høj effekt mod græsukrudt og er en resistensbryder.

Læs mere om anvendelse af Kerb i artiklen Strategi for ukrudtsbekæmpelse i vinterraps.

Væselhale breder sig til flere og flere marker. I vinterrapsen kan væselhale for alvor brede sig, da tidlig såning fremmer forekomsten af væselhale, og i de åbne områder i vinterrapsen kan væselhale blive voldsomt dominerende.

Kerb har en god effekt på væselhale, men ved stor mængde er Kerb ikke fuldt effektiv. I praksis ses, at væselhale visner ned, men skyder igen i foråret og sætter en del frøstængler. Hermed sker der en opformering og spredning af væselhale.

OBS: Det bør overvejes, om de større stærkt inficerede områder eller hele marker allerede nu skal udpeges og ikke Kerb-sprøjtes, så omsåning kan foretages.

Når først der er anvendt Kerb, er mulighed for omsåning begrænset. Der må ikke sås korn i 7 mdr. efter behandling. Ved omsåning efter Kerb-behandling kan der ifølge etiketten kun etableres vårraps, ærter, majs og kartofler. Og er der desuden behandlet med Belkar i vinterrapsen, er omsåning med ærter og (heste)bønner også ude af billedet. Derfor er det vigtigt at målrette Kerb-behandling til områder i marken, hvor man forventer at undgå omsåning.

Udfør et "før-Kerb" besøg i marken og vær kritisk med at udpege områderne med væselhale. Tro ikke at de tætte inficerede områder nok skal forsvinde, se billederne. Særligt udfordret er de tynde rapsmarker. De udpegede områder sprøjtes ikke med Kerb, men nedvisnes i stedet med glyphosat. Større områder eller hele marker kan omsås med vårsæd. Mindre områder kan henligge urørt, idet eventuel nyfremspiring af væselhale i foråret ikke sætter frø.





Billede 1: Væselhale kan etablere sig voldsomt i tynde rapsmarker. Anvendelse af Kerb i denne mark kan ikke bekæmpe væselhale og omsåning bør overvejes.



Billede 2: Selvom der sprøjtes med Kerb mod væselhale, vil mange væselhale genskyde i løbet af vinter og forår og give en stor opformering i vinterrapsmarken.

Emneord

Integreret plantebeskyttelse - IPM

Plantebeskyttelsesmidler

Ukrudt

+1

Sidst bekræftet/revideret: 29. oktober 2020



Carsten Fabricius

Landskonsulent, Afdelingsleder

SEGES

cars@seges.dk

+45 8740 5357

Støttet af

Promilleafgiftsfonden for landbrug

Landbrug & Fødevarer F.m.b.A. SEGES

Tlf. 87 40 50 00

Agro Food Park 15

Fax. 87 40 50 10

8200 Aarhus N

Email info@seges.dk

