

Væselhale kan blive så voldsom, at den udkonkurrerer vinter-rapsen fuldstændig.
Foto: Carsten Kløcher, Djursland landboforening.



STØTTET AF

Promille afgiftsfonden for landbrug

Gå rapsen kritisk igennem for væselhale før Kerb-sprøjtning



Eksperter

Carsten Fabricius,
afdelingsleder,
Planteværn, Plante- &
Miljøinnovation, Seges

Af Carsten Fabricius,
Plante- & Miljøinnovation, Seges

Væselhale breder sig som græs-ukrudt i mange marker. I sæson 2020 så vi mange vinterrapsmarker med meget væselhale. Det til trods for at markerne var behandlet med Kerb, der er effektiv mod væselhale.

Den tilsyneladende spinkle væselhale-plante kan i mere åbne rapsmarker få overtaget og kvæle den resterende vinterraps. På billedet er vist en tynd vinterraps, men hvor væselhale blev dominerende.

Bekæmpelse i raps

Særligt i de pløjefri etablerede rapsmarker skal der være fokus på væselhale. I nogle områder er der enkelte eller få planter pr. kvm,



Tætte bestande af væselhale er vanskelige at bekæmpe effektivt.

mens andre områder er mere som en græsplæne af væselhale.

Bekæmpelsen af væselhale skal foretages med 1,25 liter Kerb i starten af november måned for at få god effekt.

I Mark 5 viste vi i artiklen Månedens forsøg, at Kerb er effektiv mod væselhale. Desværre kan væselhale genskyde. I første omgang ses en god tilfredshed med effekten. Men ved opgørelsen i foråret ses en del væselhale tilbage.

Selv få tilbageværende væselhale planter udgør et stort problem.

Undgå at sprede frøene

Viser det sig til foråret, at vinterrapsen er for tynd, og væselhalen har godt gang i væksten, er mulighed for omsåning efter Kerb-behandling begrænset. Der må ikke sås korn i syv måneder efter behandling.

Derfor er det en god idé at gennemgå sine rapsmarker inden Kerb-sprøjtning for at udpege problemområder i marken.

De udpegede områder bør ikke sprøjtes med Kerb, men nedvisnes med glyphosat og sås vårsæd i - eller henligges uden frøspild af væselhale.

En stor opformering af væselhale i marken giver udfordringer i mange år efter - og risiko for spredning med mejetærskeren.

Desværre findes også hele marker med udbredte problemer med væselhale. Her er det vigtigt rettidigt at få taget beslutning om omsåning for ikke at forurene marken yderligere med væselhalefrø.



Væselhale i raps

- Væselhale kan kvæle rapsen i åbne rapsmarker. Bekæmp med 1,25 liter Kerb pr. ha først i november.
- Problemområder i marken bør dog ikke Kerb-sprøjtes, men nedvisnes med glyphosat - og efterfølges af vårsæd eller henligge.