



Promilleafgiftsfonden for landbrug

Væselhale kan bekæmpes i vinterraps



Af Carsten Fabricius,
landskonsulent, Seges

I de senere år er græsukrudtet væselhale begyndt at sprede sig voldsomt. Væselhale findes i stort set hele landet uanset dyrkningssystem og sædskifte. Kemisk bekæmpelse er vanskelig, da effekten af ukrudtsmidlerne kan være meget varierende og oftest ganske ringe.

I vinterraps kan udfordringen med væselhale også være problematisk. Såning af raps i august på arealer med væselhale kan give en stor fremspiring og et udbredt tæppe i bunden af rapsen i efteråret. Det kan hæmme rapsens udvikling. Derfor er der i samarbejde med planteværnsfirmaet Albaugh anlagt tre forsøg i efteråret 2019, der skal belyse en strategi for bekæmpelse af væselhale i raps om efteråret.

Forsøget kort

De tre forsøg er alle anlagt på arealer med stor bestand af væselhale. Det ønskes afprøvet, om brug af clomazon-holdigt produkt som f.eks. Clomate kan hæmme væselhale. I raps ved vi, at Kerb er ganske effektivt mod væselhale, men der er en meget lang periode fra såning til brug af Kerb i november. En stor bestand af væselhale kan i denne periode påvirke rapsens udvikling negativt. I forsøget er der afprøvet kombinationer med Clomate



Kerb er effektiv til bekæmpelse af væselhale. Til højre er behandlet med Kerb - til venstre er ubehandlet.

før fremspiring - med og uden Kerb efterfølgende.

Clomazon hæmmer

I figuren vises resultaterne fra optalt antal væselhale pr. kvm i september. Optællingerne er foreløbige og ikke valideret, men giver dog en idé om effekten af clomazon efter såning. De forsøgsled, der har fået Clomate, har et lavere antal væselhale end de ubehandlede. Det skal bemærkes, at antallet af væselhale er ekstremt stort i to af forsøgene. Clomate kan



Dronefoto af væselhaleforsøg på Djursland. Det er tydeligt at se behandlinger med Kerb, der er helt brune i bunden. De grønne parceller er enten ubehandlet eller uden Kerb. Foto: Corteva Agriscience.

hæmme væselhale, men ikke bekæmpe det.

Kerb er essentiel

På billederne ses bekæmpelse med Kerb i det ene forsøg på Djursland. Det er meget tydeligt at se effekten af Kerb i november. Der er i forsøget brugt 1,25 liter pr. ha, og det har været yderst effektivt.

Forsøget viser tydeligt, at Kerb er helt essentiel i bekæmpelse af væselhale. Det giver både en effektiv bekæmpelse og er vigtigt i resistensstrategi. Kerb har en helt anden virkemekanisme end ALS-midler i korn. Samtidig minimeres risikoen for resistens væsentligt ved kun at bruge Kerb i raps med flere års afstand. Clomazon anvendt lige efter såning ser ud til at kunne hæmme væselhale, men ikke bekæmpe det tilfredsstillende. Så det er kun aktuelt på arealer med meget stor bestand.



Figur: Optælling af væselhale med planter pr. kvm i september efter behandling med Clomate.