

Få styr på polteholdet



Konklusion:

Kuldstørrelsen øges med en gris, hvis polten løbes i anden brunst dag 25–30 efter flytning. Flushing i 10-14 dage vil øge kuldstørrelsen.

Af Flemming Thorup, chef-forsker, ft@seg.es.dk

Polte udgør 25 pct. af soholdet, så der er god grund til at have lige så godt styr på deres brunst og løbning, som du har på søerne. Dage til løbning registreres imidlertid ikke hos polte, så du har ikke baggrundsviden for at forbedre produktiviteten for en fjerdedel af besætningen.

Betydningen af at kende antal dage til løbning blev afprøvet i to besætninger, hvor poltene fik deres sonummer, allerede når de blev overført til soholdet, hvor de straks fik daglig kontakt med en orne.

Tabel. Data fra en afprøvning af brunstsynchronisering

Variabel	Aktuelt for polte	Mål for polte
% løbet af indsatte polte	90	95
Alder ved ornekontakt, dage	200	Besætningsafhængigt
Dage fra indsætning til 1. brunst.	21	10
I brunst 4-8 dage efter ornekontakt, %	32	90
Dage fra indsætning til løbning	48	26
Løbne polte løbet i 2. brunst, %	82	95
Dage fra indsætning til afgang/død for polte som ikke løbes	62	30

Tabellen viser poltenes resultater sammenlignet med det optimale.

Forventninger

Når kønsmodne polte, som ikke er cykliske, flyttes til løbestalden og får ornekontakt, ses brunst fire til otte dage senere.

Kuldstørrelsen øges med en gris, hvis polten løbes i anden brunst dag 25–30 efter flytning. Flushing i 10-14 dage vil

øge kuldstørrelsen.

Virkeligheden

I de to besætninger gik der i gennemsnit 48 dage til løbning. Det var 22 dage mere end forventet, hvilket koster dobbelt så mange stipladser og 22 ekstra foder- og brunstkontroldage – i alt 150 kr. pr. polt. De 22 dage giver 15 kg tilvækst. Tungere søer i de følgende drægtigheder koster 20 FEso ekstra pr. årsso. 18 pct.

Tabel for brunstsynchronisering.

af poltene bliver løbet i første brunst, hvilket giver 0,1 gris mindre pr. årsso.

Du skal kende poltens fødselsdato. Giv polten sit sonummer ved første brunststimulering, og registrer dato for første brunst. Resten registreres allerede. Brunst lige efter flytning kræver at;

- ▶ poltene ikke er for unge og ikke allerede cykliske,
- ▶ poltene ved brunstkontrol er samlet i få stier,
- ▶ der gennemføres brunstkontrol alle ugedage,
- ▶ ALLE polte i stien tildeles mindst 3,3 FEso/dag,
- ▶ der er mindst 100 lux ved poltens hoved,
- ▶ der er god ornekontakt MINDST én gang dagligt,
- ▶ man registrerer brunst, så dag for anden brunst kendes.