

Aftenfodring kan være gavnlig for faringen

Fodring: Seges Svineproduktion arbejder løbende på at sikre, at søerne fodres korrekt, så faringen forløber uproblematisk og med få dødfødte grise. Læs hvordan teori omsættes til handling.

Konklusion

Har du for mange dødfødte i din besætning, kan aftenfodring overvejes, men husk, at faringshjælp er vigtigst af alt.

Af Gunner Sørensen, chefforsker, gs@seges.dk

I 2017 var der 1,8 dødfødte grise pr. kuld, svarende til, at 9,6 pct. af de totalfødte grise var dødfødte, men de bedste besætninger viser, at det er muligt at ligge under 5 pct. dødfødte af de totalfødte grise. I det følgende fokuseres på, hvordan foderingsmanagement kan anvendes til at optimere faringspræstationerne.

Foderstyrke op til faring

I mange besætninger har der været tradition for at reducere foderstyrken til 2,0 til 2,5 FE to til tre dage før forventet faring. Det er dog ikke optimalt, idet anbefalingerne hidtil har været at reducere foderstyrken fra 3,5 FE til 3,0 FE pr. dag et til to dage før forventet faring. En Tour de France-rytter dropper heller ikke aftensmaden de sidste to dage før en bjerge-




tape!! I dag har rigtig mange besætninger gode erfaringer med at fortsætte med de 3,5 FE helt hen over faringen, og teoretisk set giver det god mening, at søerne kan drage nytte af den ekstra energi. Gyltene kan få problemer med MMA ved den højere foderstyrke, så de kan reduceres til 3,0 FE et døgn før forventet faring.

Fordeling af foderin- gerne over døgnet

Peter Theil fra Aarhus Universitet har vist, at der var en klar sammenhæng mellem foderingstidspunkt, faringslængde og antal dødfødte grise. Jo længere tid der gik fra søerne havde fået foder, jo mere langtrukken blev faringen. I praksis betyder det, at søerne har mere energi til faringerne om aften/natten, når de fodres i løbet af aftenen. Derfor er anbefalingen, at søerne skal fodres mindst tre gange dagligt, hvoraf den ene fodring er en aftenfodring. Så fordeles den tildelte energi over døgnet, og der vil sandsynligvis være et reduceret behov for fødselshjælp.

Oplevelser ved at indføre aftenfodring

Seges Svineproduktion har



Procent dødfødte grise af totalfødte grise i kullet (gennemsnit pr. ugehold) henholdsvis før (rød) og efter (grøn) indførelsen af aftenfodring i tre besætninger.

Foderstrategi op til faring

Der skal fodres tre gange dagligt op til faring:

- To fodringer lægges indenfor normal arbejdstid f.eks klokken 7.00 og 14.00
- Tredje fodring f.eks. klokken 21.00 ved aftenovervågningen af faringerne
- Gylte og søer skal have 3,5 FE pr. dag, der deles ligeligt mellem de tre fodringer, men gylte kan nøjes med 3,0 FE pr. dag, hvis der er problemer med MMA

ning, kan det ikke udelukkes, at aftenfodringen i en ud af tre besætninger samtidig har medført en bedre faringsovervågning om aftenen.

I besætningen, der forsøgsvis fodrede hver fjerde time, blev der ikke set en ændring i andelen af dødfødte grise, i forhold til de søer, der var fodret med otte timers interval. Producenten bemærkede i øvrigt, at når fodermængden pr. udfodring var meget lav, så valgte nogle søer ikke at rejse sig og æde.

besøgt tre besætninger for at høre om deres praktiske erfaringer med at indføre en aftenfodring og har indhentet data fra faringerne før og efter, at aftenfodringen blev indført. To besætninger brugte tørfoder og en besætning brugte vådfoder, og alle tre besætninger tildelte 3,0 FE pr. dag de sidste to døgn før faring. Fodringerne var placeret klokken 7, 14 og 21. Derudover har Seges Svineproduktion set på faringsdata fra en besætning, som fodrede søerne med tørfoder i et luftassisteret foderingsanlæg seks gange dagligt med fire timers mellemrum op til faring.

De praktiske erfaringer fra de tre besætninger var, at de ansatte fornemmede, at faringerne forløb hurtigere og at søerne hurtigere kom i gang med at æde og malke efter faring. I figuren ses, hvordan dødfødte i procent af totalfødte var pr. ugehold, både før og efter aftenfodringen blev introduceret. Det ses, at der ikke var samme effekt i alle tre besætninger, og da der ikke var tale om en kontrolleret afprøv-