

# Hernie:

## zece sfaturi pentru reducerea riscului

1

Boxele de fătare trebuie dezinfectate și uscate.

3

Faceți tot posibilul pentru a ușura fătatul.

5


Tăiați cordonul ombilical cu maxim trei centimetri. În industria porcină nu există o opinie comună privind care cordon ombilical este mai bine de tăiat - umed sau uscat. Cel mai bine este să scurtați cordonul ombilical prin ardere, nu vă grăbiți și nu rupeți cordonul ombilical. În caz de utilizați foarfecele, acestea trebuie dezinfectate după fiecare purcel.

7

După scurtarea cordonului ombilical, aplicați un plastru pe el.

9

Nu strângeți burta porcului în timpul castrării.



2

În întreaga boxă trebuie aruncată paie în cantitate de așternut moale.

4

Asigurați o cantitate moderată de rumeguș de lemn sau făină de cartofi, posibil în amestec cu Stalosan F® sau alt dezinfectant, în blocul pentru porci.

6

Dezinfectați ombilicul cu clorhexidină alcoolică sau iod alcoolic. Puteți, de asemenea, să utilizați Ciclo spray sau un alt spray cu antibiotic, dar nu uitați să-l înregistrați ca un antibiotic.

8

Ridicați și coborâți porcul în boxă, ținându-l sub burtă și nu-l strângeți.

10

Asigurați toți porcii cu coraslă suficientă și evitați apariția diareei și tusei



[svineproduktion.dk](http://svineproduktion.dk)