

NYE FODERKURVER TIL DRÆGTIGE SØER

Thomas Sønderby Bruun, specialkonsulent, Team Fodereffektivitet

Temagruppen Ernæring, Centrovice Vissenbjerg

5. december 2019

Anbefalede foderkurver (nuværende)

FEso pr. so pr. dag

Dage	Fed	Middel	Mager	Gylte
Rygspæk v. frav.	>16 mm	13-16 mm	<13 mm	
0	2,5	3,0	4,5	2,2-2,4
26	2,5	3,0	4,5	2,2-2,4
31	2,0	2,5	3,7	2,5-2,7
76	2,0	2,5	3,7	2,5-2,7
81	3,5	3,5	4,0	3,3
112	3,5	3,5	4,0	3,3
114	3,5	3,5	3,5	3,3
115	3,0	3,0	3,0	3,0
Faring	3,0	3,0	3,0	3,0
Rygspæk v. far.	16-19 mm	16-19 mm	16-19 mm	16-19 mm

Anbefalede foderkurver (nuværende)

FEso pr. so pr. dag

Dage	Fed	Middel	Mager	Gylte
0	2,5	3,0	4,5	2,2-2,4
26	2,5	3,0		2,2-2,4
31	2,0 ⇒ 2,3	2,5		2,5-2,7
76	2,0 ⇒ 2,3	2,5		2,5-2,7
81	3,5	3,5		3,3
112	3,5	3,5	4,0	3,3
114	3,5	3,5	3,5	3,3
115	3,0	3,0	3,0	3,0
Faring	3,0	3,0	3,0	3,0

Faglig begrundelse for at fodring under vedligehold kan have betydning for spredning i fødselsvægt $\geq$ vedligehold

Anbefalede foderkurver (nuværende)

FEso pr. so pr. dag

Dage	Fed	Middel	Mager	Gylte
0	2,5	3,0	4,5	2,2-2,4
26	2,5	3,0	4,5	
31	2,0	2,5 ⇒ 2,3	3,7	
76	2,0	2,5 ⇒ 2,3	3,7	
81	3,5	3,5	4,0	3,3
112	3,5	3,5	4,0	3,3
114	3,5	3,5	3,5	3,3
115	3,0	3,0	3,0	3,0
Faring	3,0	3,0	3,0	3,0

Ingen grund til at booste
tilvæksten unødigt meget
>vedligehold

Kilde:

Anbefalede foderkurver (nuværende)

FEso pr. so pr. dag

Dage	Fed	Middel	Mager	Gylte
0	2,5	3,0	4,5	2,2-2,4
26	2,5	3,0	4,5	2,2-2,4
31	2,5	3,0	3,7 ⇒ 3,5	2,5-2,7
76	2,5	3,0	3,7 ⇒ 3,5	2,5-2,7
81	2,5	3,0	4,0 ⇒ 3,5	3,3
112	3,5	3,5	4,0 ⇒ 3,5	3,3
114	3,5	3,5	3,5	3,3
115	3,0	3,0	3,0	3,0
Faring			3,0	3,0

Forsimpling baseret på at
huldet reetableres uge 1-4

Hvis dette er nødvendigt er
det evnerne til huldstyring
der fejler

Anbefalede foderkurver (nuværende)


FEso pr. so pr. dag

Dage	Fed	Middel	Mager	Gylte
0	2,5	3,0	4,5	2,2-2,4
26	2,5		4,5	2,2-2,4
31	2,0		3,7	2,5-2,7
76	2,0		3,7	2,5-2,7
81	3,5	3,5	4,0	3,3
112	3,5	3,5	4,0	3,3
114	3,5	3,5	3,5	3,3
115	3,0 ⇒ 3,5	3,0 ⇒ 3,5	3,0 ⇒ 3,5	3,0 ⇒ 3,0-3,5
Faring	3,0 ⇒ 3,5	3,0 ⇒ 3,5	3,0 ⇒ 3,5	3,0 ⇒ 3,0-3,5

I forhold til modelleringer
reduceres foderet når der er
allerstørst behov til foster-
og yvervækst

Konsekvenser på søernes tilvækst i drægtigheden


Effekterne afhænger af foderets lysin- og proteinindhold



■ Tidligere anbefalede foderkurver ■ Reviderede foderkurver

Konsekvenser på søernes tilvækst i drægtigheden


Effekterne afhænger af foderets lysin- og proteinindhold



■ Tidligere anbefalede foderkurver ■ Reviderede foderkurver

Konsekvenser på søernes tilvækst i drægtigheden


Effekterne afhænger af foderets lysin- og proteinindhold



■ Tidligere anbefalede foderkurver ■ Reviderede foderkurver

Konsekvenser på søernes tilvækst i drægtigheden


Effekterne afhænger af foderets lysin- og proteinindhold



■ Tidligere anbefalede foderkurver ■ Reviderede foderkurver


Konsekvenser på søernes tilvækst i drægtigheden

Effekterne afhænger af foderets lysin- og proteinindhold



Konsekvenser på søernes tilvækst i drægtigheden

Effekterne afhænger af foderets lysin- og proteinindhold



Anbefalede foderkurver (nye)

FEso pr. so pr. dag

Dage	Fed	Middel	Mager	Gylte
0	2,5	3,0	4,5	2,2-2,4
26	2,5	3,0	4,5	2,2-2,4
31	2,3	2,3	3,5	2,5-2,7
76	2,3	2,3	3,5	2,5-2,7
84	3,5	3,5	3,5	3,3
112	3,5	3,5	3,5	3,3
114	3,5	3,5	3,5	3,3
115	3,5	3,5	3,5	3,0-3,5
Faring	3,5	3,5	3,5	3,0-3,5

TAK og husk!

Vær altid opdateret på den seneste faglige viden

Tilmeld dig **Nyhedsmail** fra
SEGES Svineproduktion på
www.svineproduktion.dk



 facebook.com/SegesSvineproduktion