



Pattegriseliv2

Flemming Thorup, Team Produktionsstyring

Dag 2-4 i grisenes liv

Brunsgård

21. februar 2020

STØTTET AF

Svineafgiftsfonden



I er gode

- Husk, at I passer søer med verdens højeste kuldstørrelse
- Pattegrisedødeligheden er den laveste i Europa
- I overholder en masse regler, som giver jer ekstra arbejde
 - Fravænningsalder, dyrevelfærd, lavt antibiotikaforbrug,
- I begynder i farestalden med meget forskellige uddannelser
- I lærer om pattegrise på hver jeres måde
 - Sidemandsoplæring, landbrugsskole, facebook, internettet, rådgivning

De vigtigste årsager til pattegrisedødelighed

- Grisen er svagfødt (dør mellem 24 og 48 timer efter fødsel)
- Der er ikke plads ved yveret (**dør dag 2-7**)
- Sygdom (PRRS, diarre, ledbetændelse, blodforgiftning, influenza) **Afhænger af årsag**
- Skader (trådt på, inventar, klemmt) **Afhænger af årsag. Mest svage grise.**
- Grisen er misdannet (brok, andre misdannelser). **Aflives.**

Dette forklarer ikke pattegrisedødelighed

- Fødselsrækkefølgen
 - Men rækkefølgen har stor betydning for antal dødfødte grise
- Modersøens kuldnummer
 - En dårligt immuniseret gylt kan dog have grise med høj dødelighed
 - Kuldnummer har stor betydning for antal dødfødte grise
- Kuldstørrelsen har begrænset betydning
 - Kuldstørrelsen har stor betydning for antal dødfødte grise
- Årstiden
- Mælkeydelsen har ikke betydning for antal grise. Måske har antal patter.
 - En so som ikke giver mælk, kan ikke passe grise
 - Mælkeydelsen har stor betydning for tilvæksten
 - Antallet af tilgængelige ventiler bestemmer antal grise, som soen kan passe


Hvad er overstået dag 2?

- Grisene har fået råmælksantistoffer
- "For små" grise er døde
- Grisene er registreret og har fået klippet hale
- De mindste pattegrise ligger hos mindsteammer
 - Nogle er allerede døde
- Der er lavet ammesøer
- Farefeber er behandlet og overstået
- Grisene er ved at danne en rangorden
- Der laves nok stadig kuldudjævning
- Dag 2 kan soen genkende grisene, så kuldudjævningen bør stoppe

Hvad udfordrer dag 2-4


- Der er grise som ikke trives. Hvad gør du med dem?
 - Tilskud, flytning, ombytning, intet?
- Der er søer, som ikke giver mælk
- Du har meget arbejde, som påvirker grisene
 - Haler, kastrere, vaccinere, jern, fravænne næste sektion
- Der er måske weekend

Udviklingen i kuldstørrelse




S:\Ludata\opal\Data\P350800\GRAFER\e_kontrollen, udvikling, jurve, FT.xls

Procent dødfødte grise og døde grise i % af totalfødte grise




Grise. Fordeling efter fødselsvægt




% af grisene 0,2 1,3 2,7 3,8 6,0 6,2 10,4 9,9 11,3 12,2 9,4 9,9 6,9 4,0 2,7 1,5 0,9 0,2 0,2 0,2 0,1


De svage grise. Fordeling



Fødselsvægten har betydning




Overlevelsen i 2002 og i 2017. Effekt af fødselsvægt. I passer nogen andre grise.




I behøver ikke at sortere for meget i grisene

Medd. 1153. Vaalse. 3.869 pattegrise



Soen kan ikke engang passe 11 grise

(Medd. 872)




Fravænnnet

11 grise i kullet 9,6
= 87 %

13 grise går lige så godt

(Medd. 872)




Fravænnnet

■ 11 grise i kullet 9,6=87%
■ 13 grise i kullet 10,9=84 %

15 grise er udfordrende

(Medd. 872)




Fravænnnet


11 grise i kullet 9,6=87%
13 grise i kullet 10,9=84%
15 grise i kullet 11,7=78%

Overlevelse for levendefødte pattede grise ved stigende kuld størrelse.

Sørensen, afpr. 1542



De små grise er problemet, hvis der er et problem




Skader

- **Forårsaget af soen**
 - Trådt på
 - Bidt
 - Klemmt som primær årsag
 - Mange klemte med tom mave= grisens fejl
- **Forårsaget af inventaret**
 - Spalter, skarpe kanter, manglende vand
 - Knæskader fra gulvet
- **Forårsaget af dig – de hullede grise**
 - Tandslibning
 - Kastration
 - Halekupering
 - Injektioner



Skader

- Forårsaget af soen
 - Trådt på
 - Bidt
 - Klemmt som primær årsag
- Forårsaget af inventaret
 - Spalter, skarpe kanter, manglende vand
 - Knæskader fra gulvet
- **Forårsaget af dig – de hullede grise**
 - **Tandslibning**
 - Kastration
 - Halekupering
 - Injektioner



Skader

- Forårsaget af soen
 - Trådt på
 - Bidt
 - Klemmt som primær årsag
- Forårsaget af inventaret
 - Spalter, skarpe kanter, manglende vand
 - Knæskader fra gulvet
- **Forårsaget af dig – de hullede grise**
 - Tandslibning
 - **Kastration**
 - Halekupering
 - Injektioner



Skader

- Forårsaget af soen
 - Trådt på
 - Bidt
 - Klemmt som primær årsag
- Forårsaget af inventaret
 - Spalter, skarpe kanter, manglende vand
 - Knæskader fra gulvet
- **Forårsaget af dig – de hullede grise**
 - Tandklipning
 - Kastration
 - **Halekupering**
 - **Injektioner**



Misdannelser

- Brok
 - Tarmfremfald, cyster eller bylder?
 - Hvor langt falder grisen efter behandling?
- IUGR
 - Har samme overlevelse som normal lille gris
- Andre misdannelser er ekstremt sjældne
 - Det er sundt med tre-racekrydsninger



Grise dag 2-4. Mit råd til jer.

- Se på grisene hver dag
- Der er grise i hvert andet kuld, som skal have ekstra håndtering
 - Lille gris, fuld mave. Mærk grisen, se om den klarer sig.
 - Lille gris, tom mave. Hvis grisen også er strithåret, så find en anden so (opsamlingsso).
- I kan lægge nye grise til en so de første 48 timer efter afsluttet faring
- I kan lægge grise til senere. Det giver mere sygdom og koster tilvækst
 - Men I får høj egenfravænning.
- Pas på hullerne i grisene
- Fortsæt det gode arbejde

TAK og husk!

Vær altid opdateret på den seneste faglige viden

Tilmeld dig **Nyhedsmail** fra
SEGES Svineproduktion på
www.svineproduktion.dk



 facebook.com/SegesSvineproduktion