

Fokusér på tallet 92 i dit sohold

Vigtigt: Tallet 92 er et vigtigt tal i dit sohold og bør således indgå i dine mål for at opnå en succesfuld reproduktion.



Konklusion

- Nøgletal, der beskriver reproduktionen, bør løbende indgå i vurderingen af produktionstal i alle sohold. Jo bedre reproduktion er, jo nemmere er det at minimere udsving i produktionen.

Af Thomas Sønderby Bruun,
specialkonsulent

Gode nøgletal inden for reproduktionen bidrager til en stabil produktion, hvilket betyder færre udsving og dermed en lettere planlægning af holdstørrelser og flow i produktionen. Hvis nedenstående nøgletal for reproduktion er over eller under 92, har du et klart pejlemærke for enten en succes eller behov for en større indsats.

Succes med polteløbninger og høj polteudnyttelse

Mange besætninger anvender brunstsynchronisering af poltene for at sikre løbning i anden brunst. Hvis ikke 92 pct. af de brunstsynchroniserede polte viser brunst 4-10 dage efter endt behandling, er der noget galt. Problemerne skyldes typisk, at enkelte polte ikke var cykliske, da brunstsynchroniseringen blev igangsat. Alternativt viser en gennemført dataanalyse, at polte med lav rygspæktykkelse før brunstsynchronisering øger andelen af polte løbet mere end

10 dage efter endt brunstsynkronisering.



En høj polteudnyttelse karakteriseres ved, at mindst 92 pct. af de polte, der løbes til første kuld, også løbes til andet kuld. Der er en stor variation mellem besætninger, når der ses på dette nøgletal. I et afsluttet polte-projekt opnåede en besætning med super management, at kun 3-5 pct. af de løbne polte ikke blev løbet til andet kuld. Det er værd at stile efter,

Når 92 procent af poltene til løbning i andet kuld giver det maksimale værdi.

at mindst 92 pct. af poltene når til løbning i andet kuld, da det giver maksimal værdi i forhold til omkostningen ved udskiftning af avlsdyr. Fokusér derfor på, om der afgår for mange af de helt unge dyr i din besætning.

God brunst efter fravænnning

Kommer søerne i brunst 4-5 dage efter fravænnning? Dette spørgsmål er relevant, og overordnet set bør mindst 92 pct. af de fravænnede søer komme i brunst 0-7 dage efter fravænnning. Er dette ikke tilfældet, er det værd at se på, hvor mange søer der kommer i brunst 20-24 dage efter fravænnning (de har med stor sandsynlighed været i brunst fra fravænnning til



Faringsprocent i 200 højproduktive danske besætninger.



dag 3 efter fravænning), og hvor mange søer der kommer i brunst 25-28 dage efter fravænning. Er dette tal meget over 1-1,5 pct. af det samlede antal løbninger, tyder det på, at søer i brunst dag 4-7 bliver overset. Brug analyserne i AgroSoft (fordelingskurve) eller Cloudfarms (kuldfordelingsanalyse) til at overvåge dette løbende.

Høj faringsprocent

Et udsnit med 200 højproduk-

tive danske sohold illustrerer (se figur) en betydelig variation i faringsprocenten – en faringsprocent på 92 er et opnåeligt og realistisk mål. Den høje faringsprocent opnås ved, at søerne fravænnnes i et fornuftigt huld, ikke har tabt mere end 2-4 mm rygspæk i løbet af diegivningsperioden og, at de løbes optimalt. Søer, der kommer tidligt i brunst, har en lang brunst, hvorfor brunstkontrol og løbearbejdet ikke må afsluttes for tidligt på disse dyr. Sørg for god hygiejne bag søerne og ved selve insemineringsarbejdet. I et nyt projekt vil Seges undersøge, om ekstra hygiejne ved brug af enkeltindpakkede katetre kan øge faringsprocenten. Ideen er, at indpakningen føres med ind og først brydes, når katetret er ca. 5 cm inde i skeden, hvilket forhindrer bakterier i at nå helt ind til børhalsen med skumproppen.



Fakta

Succesfuld reproduktion er kendetegnet ved, at

- mindst 92 pct. af poltene insemineres 4-10 dage efter afsluttet brunstsynkronisering
- faringsprocenten er over 92
- andelen af søer, der løbes 0-7 dage efter fravænning, er over 92 pct.
- andelen af løbne polte, der løbes igen til andet kuld, er over 92 pct.