

Soen kan passes til at passe 15 grise - uden mælkeanlæg

Chefforsker Vivi Aarestrup Moustsen,
SEGES Svineproduktion

God adgang til patter – nemmere at være gris 😊



video

Er det en patte per gris eller? Der skal være mælkeproducerende væv!



Soens pasningsevne

- Udfordringer


- Mange søer får flere levendefødte end patter
 - De kan ikke die alle sammen samtidigt
- Mange stier til ammesøer
- Der går tid på at søer ammer
- Pattegris
- Mælkeanlæg tager også tid ☹

Udnyt soens egen pasningsevne
• *Bedste og billigste mælk til grisene*

- Kend niveauet

- Forudsætning for at kunne flytte sig






Oversigt over summen af antal patter for alle besætninger (x-akse: besnr.). S11 er andelen af søer i besætningen med 11 patter, S12 er andelen af søer i besætningen med 12 patter osv.

Meddelelse
nr. 1117

Fravænnede/fravænning – pr uge – en besætning

Erfaring
nr. 2001



Kan en so passe flere grise end patter?

Uden supplerende mælk

- Antagelse
 - Mindst 1 gris mindre ved søer med 14 patter sammenlignet med søer med 15 patter
- To grupper i forsøget:
 - 15 patter - kuldudjævnet til 15 grise
 - 14 patter - kuldudjævnet til 15 grise

Uden supplerende mælk

	15 patter	14 patter
Antal kuld, stk	73	73
Levf., stk/kuld.	18,5 (3,4)	19,2 (3,2)
Dødfødte, stk/kuld	1,8 (1,8)	1,5 (1,6)
Totalfødte, stk/kuld	20,3 (3,6)	20,6 (3,6)


Video fra besætning - resultater




Video fra besætning – how to – Klargøring til faring




Video fra besætning – how to – Faring og kuldudjævning



Video fra besætning – how to – Ammesøer




Video fra besætning – how to – Daglig gennemgang




Video fra besætning – how to – Tælle patter




Video fra besætning – how to – Soens pasningsevne




Video fra besætning – how to – Marcipan-grise



Video fra besætning – how to – Klar til weekend



Video fra besætning – how to – Klar efter weekend



Plads ved yver



Plads ved yver



Plads ved yver




Plads ved yver





Plads ved yver




Træerne vokser ikke ind i himlen.....



- Forsøg
- De største blev sat til ammesøer
- De mindste til 3.-4.lægs
- Vi var der om tirsdagen;
 - så 15 grise i alle kuld tirsdag
- En gris kunne flyttes væk



Antal grise i kuldene dag 21



Meddelelse
nr. 1197

Resultater


Meddelelse
nr. 1197

	15 patter	14 patter	P-værdi
Antal grise D21¹, stk./kuld	14,3	14,0	0,61
Kuldvægt D21¹, kg	92,4	90,7	0,31
Tilvækst, kg/kuld/dag ved 13 grise i kullet D21¹	2,9	3,1	0,41
Tilvækst, kg/kuld/dag ved 14 grise i kullet D21¹	3,3	3,3	0,93
Tilvækst, kg/kuld/dag ved 15 grise i kullet D21¹	3,5	3,7	0,18
Tilvækst per foderdag, g/dag/gris	234	234	0,46
Vægt D21¹, kg/gris i kullet	6,5	6,5	0,86

¹ Fast ugedag.

² Alle værdier er korrigerede middelværdier (LSMEANS).

Antal grise D21 i forhold til antal patter



Meddelelse
nr. 1197

Når der ikke er forsøg.....så er kuldudjævningen:

Besætningens mål

- Salgsklare grise ud af stalden

Besætningens erfaring

- Grisene vokser ikke af at blive flyttet rundt – de skal placeres rigtigt første gang
- Efter kuldudjævning – så flyttes ikke mere (medmindre <10 grise)
- Alle 1.lægssøer skal gerne have 14 ekstra diedage – så de skal være ammesøer
- 1.lægs skal have store grise for at blive malket op
- 2. lægs skal have mellem grise
- 3.-4. læg kan passe små grise
- Ældre søer skal have store grise for at blive malket
 - Soens malkehistorie og præsentation af yver/patter til grise
- 'Aldrig' flytte en enkelt gris



MALKEEVNE

Fokus på søernes malkeevne - de bedste malkere kan/skal bruges til ammesøer - dårlige malkere skiftes ud!

Ved fravænning gives en karakter for hvor flotte grise der fravænnenes:

1 "Marcipangrise"



2 Gennemsnitsgrise



3 Ringe grise



TAK og husk!

Vær altid opdateret på den seneste faglige viden

Tilmeld dig **Nyhedsmail** fra
SEGES Svineproduktion på
www.svineproduktion.dk



 facebook.com/SegesSvineproduktion