

## Nortron SC (havefrøafgrøder)

Ukrudtsmidlet [Nortron SC](#) (18-426) er blevet godkendt til mindre anvendelse i rødbeder, bladbeder, skorzonner, Nigella, Lupin, Iberis sp., Gypsophila sp., Adonis, Cynoglossum sp., Chrysanthemum segetum, Chrysanthemum carinatum, Calendula og Malva til frøproduktion på friland.

Vejledningen:

- Må kun anvendes mod græs- og bredbladet ukrudt i rødbeder, bladbeder, skorzonner, Nigella, Lupin, Iberis sp., Gypsophila sp., Adonis, Cynoglossum sp., Chrysanthemum segetum, Chrysanthemum carinatum, Calendula og Malva til frøproduktion på friland
- Halmen og rester må ikke opfodres
- Brugsanvisningens angivelse af dosering, antal behandlinger, interval og sprøjte-tidspunkt skal overholdes
- Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand

Nortron SC må i afgrøderne Nigella, Lupin, Iberis, Gypsophila, Cynoglossum, Chrysanthemum segetum, Chrysanthemum carinatum, Calendula, Adonis og Malva anvendes mod nyfremspiret ukrudt 1 gang pr. vækstår med max 0,23 L/ha

Skorzonnerod må i etableringsåret behandles 2 gange med et interval på min. 7 dage med en max dosering på 0,23 L/ha pr behandling.

Skorzonnerod må i 2. års marken i august måned behandles 2 gange med et interval på min. 7 dage, med en max dosering på 0,23 L/ha pr behandling.

Rød- og bladbeder må i august måned behandles 2 gange med et interval på min. 7 dage, med en max dosering på 0,23 L/ha pr behandling.

[Læs vejledningen til mindre anvendelse omhyggeligt før brug.](#) Vejledningen og yderligere oplysninger om produktet findes på [Middeldatabasen](#).

Læs mere om [Nortron SC](#) i Middeldatabasen.

22. juni 2021