

Kvæg

Tænk smittebeskyttelse mod salmonella før græsningssæsonen starter

Skal du have kvæg på græs, så brug tiden, før det går løs, til at tænke i smittebeskyttelse.

Nyhed | 26. marts 2021

Antal sidebesøg: 42



Det er ærgerligt at få salmonella i besætningen, fordi man har haft sine dyr på græs. Og det er der desværre flere besætninger, der har oplevet, fortæller dyrlæge Malene Budde, SEGES.

"Jeg har oplevet flere besætninger, som er blevet smittet på den konto. Både tilfælde, hvor kvierne er løbet sammen, og tilfælde, hvor det er sket i forbindelse med fællesgræsning," fortæller hun.

Og hendes eksempler er ikke enkeltstående tilfælde. Hvert år i sensommeren og efteråret ses en stigning i antallet af positive salmonellaprøver i kvægbesætningerne. Og en af årsagerne er ifølge Malene Budde højst sandsynligt, at dyrene smittes, når de er på græs.

Lad være med at blande dyr hvis du vil undgå smitte med salmonella

Hendes anbefaling er derfor allerede nu at tænke i smitteforebyggelse før græsningssæsonen. Regel nummer ét er selvsagt ikke at blande sine dyr med andre besætninger:

"Vi vil alle gerne være hjælpsomme. Derfor kan det være fristende at lukke naboens løse kvier ind til sine egne dyr enten ude på marken eller på stald. Men lad være! Der er en stor risiko for at få smitte ind i besætningen, hvis der kommer fremmede dyr ind," lyder formaningen fra Malene Budde.

Hun understreger samtidig, at hvis man deler kreaturvogn med naboen, skal man sørge for at vaske og desinficere den mellem brug.

Krav til salmonella niveau 2-besætninger om forsvarlig hegning

Hvis nabobesætningen eller ens egen besætning er i salmonella niveau 2, er det også en god idé at snakke sammen, og man skal så vidt muligt undgå, at dyrene kommer til at gå op ad hinanden. "Hvis det ikke kan undgås, er det sikreste at lave dobbelthegning," forklarer Malene Budde.

Hun understreger i den forbindelse, at det for alle besætninger i niveau 2 og 3 jf. salmonellabekendtgørelsen skal sikres, at der er sat forsvarlig hegn om dyrene, når de er på græs, så de holdes fysisk adskilt fra andre besætninger. Med forsvarlig hegning menes blandt andet intakt hegn, passende strømstyrke og ingen beplantning, der rører ved hegnet. Og så skal hegnet naturligvis efterses jævnlige.

Hvis uheldet alligevel er ude og besætningens dyr kommer i kontakt med andre kreaturer i afgræsningsperioden, anbefaler Malene Budde, at man tager fat i sin praktiserende dyrlæge og får lavet en plan for den bedst mulige håndtering.

Artiklen har været bragt i [KvægNyt nr. 6, 2021](#)



Emneord

kvægNYT

Salmonella

Smittebeskyttelse

Publiceret: 26. marts 2021

Opdateret: 26. marts 2021

Vil du vide mere?



Malene Budde

Dyrlæge

SEGES

mabu@seges.dk

+45 8740 5231

Støttet af

Mælkeafgiftsfonden

Kvægafgiftsfonden

Landbrug & Fødevarer F.m.b.A. SEGES

Tlf. 87 40 50 00

Agro Food Park 15

Fax. 87 40 50 10

8200 Aarhus N

Email info@seges.dk

