

Behandling af klinisk mastitis og brug af on- farm test

DDD årsmøde – 7. Oktober 2021
Nyborg Strand, 50-60 dyrlæger

Line Svennesen
Postdoc
Københavns Universitet

KØBENHAVNS UNIVERSITET



STØTTET AF
Mælkeafgiftsfonden

Forudsætninger..

- DVM 2013
- Phd om diagnostik af smitsom mastitis
- Postdoc ved Københavns Universitet
- **Projekt “Yversundhed i top” – arbejdspakke vedr. behandling af mastitis**

Praksisnær
forskning?!



STØTTET AF

Mælkeafgiftsfonden

UNIVERSITY OF COPENHAGEN
DEPARTMENT OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES



**Diagnosis of *Staphylococcus aureus* and
Streptococcus agalactiae mastitis**

Taking into account infection dynamics and teat skin as
a reservoir

PhD Thesis 2018 • Line Svennesen



Projekt: Yversundhed i top!



STØTTET AF
Mælkeafgiftsfonden

REDUCÉR BRUG AF ANTIBIOTIKA

- Hovedfokus: **Strategi for behandling af klinisk mastitis**
 - De "rigtige" køer
 - Den "rigtige" behandling





Ko-faktorer

- Alder: yngre → højere cure
- DEK: tidlig laktation → højere cure
- Mastitis-historik: første tilfælde → højere cure
 - ≥ 3 . tilfælde i laktation = uhelbredelig (Pinzón-Sánchez and Ruegg, 2011)
- Celletal: lavere SCC → højere cure
 - $\geq 3 \times SCC > 700.000$ = uhelbredelig (Østerås, 2006)
- Ydelse: højere ydelse → lavere cure



Grad af mastitis

1) **Mild:** ændringer i mælkens udseende

2) **Moderat:** ændringer i mælkens
udseende + inflammationstegn

Ikke dårligere helbredelse ved at vente 24
timer med antibiotikum (Wagner et al., 2007; Vasquez,
2017)

3) **Svær:** ændringer i mælkens udseende +
generelle sygdomstegn (almen påvirkning
fx. Feber)

Risiko for bakteriæmi – behandles parenteralt
(Wenz et al., 2011)


Højere cure rate ved svær grad af mastitis (self-cure?)
(Oliveira et al., 2013)



Diagnostik

- PCR: I princippet hurtigt svar, men ikke i praksis
- BU: 1-2 døgn, LOGISTIK!?
- On-farm culture: Kan i nogle tilfælde give et hurtigt og brugbart svar
- On-farm test: hurtig (12-14 timer) G+/G-/no-growth
- Penicillinfølsomhedstests?

Varierende sensitivitet og specifitet



https://www.quidee.de/product_info.php?products_id=136&language=en



Diagnostik: On-farm tests

- Reduktion i behandlinger = 50 % (Lago et al. 2011)
- Økonomi afhænger af besætningens patogener…
- Er beslutningsstøtte!
- Mange muligheder med forskellig performance, pris og tidsperspektiv

| Test | Ready in | Sensitivity/Specificity | Labour input | Costs |
|--|--|---------------------------------|--------------|-------|
| mastDecide | 12-14 h, G+, G-, no growth | G+: 84, 94% | + | ++ |
| VetoRapid | 24-48 h , Streps, Staphs, G-, no growth | G+: 91, 78% | ++ | ++ |
| Accumast | 16-24h, Streps (Strep. spp., Enterococci), Staphs (S. aureus, NAS), G- (E. coli, Pseu., other), no gr. | Overall: 82, 90% | ++ | ++ |
| Speed Mam Color | 48 h, Staphs, Streps, G-, no growth, 7d Myco, Antibiogram after 24 h | Overall: 92, 96% | +++ | +++ |
| Rapid Aerobic Count/ Rapid Coliform Count | 12 h; G+; G-, no growth | G+: 93, 39% | ++ | ++ |
| Aerobic Count plate Coliform Count | 24 h; G+; G-, no growth | G+: 85, 75% | ++ | ++ |
| Minnesota Easy Culture System Bi-/Tri-Plate | 18-24 h, Staph, Streps, G-; no growth | G+: 60, 83% Overall: 98, 69% | ++ | ++ |
| Mastitis SSGN /C Quad plate | 24 h; Staph., Streps, G-, no growth | Overall: 79, 79% | +++ | ++ |

Krömker 2020

Patogen

- Cure falder med stigende CFU (Ziesch et al. 2016)
- *Staph. aureus* < alle andre
- Gram negativ eller no growth > Gram + : **Self-cure?** Anvendt antibiotikum?
- β -laktamase negativ > β -laktamase positiv
- Minor pathogens > Major pathogens

Table 1: M. Ziesch
and V. Krömker, 2016

| Pathogen-related factor | Species/genus of pathogen cultured in pre-treatment sample | Significantly lower BC for cases caused by <i>S. aureus</i> than other pathogens | 7, 13, 19 |
|-------------------------|--|--|------------|
| | | Significantly higher BC for β -lactamase-negative <i>S. aureus</i> strains than for β -lactamase-positive <i>S. aureus</i> strains | 11, 14, 20 |
| | | Significantly higher BC for <i>Sc. uberis</i> than <i>S. aureus</i> , <i>Sc. dysgalactiae</i> or multiple pathogens | 12 |
| | | Significantly higher BC for CNS than <i>S. aureus</i> | 22 |
| | | Significantly higher BC for minor pathogens than major pathogens | 16, 17 |
| | | Significantly higher BC for coliform bacteria (especially <i>E. coli</i>) than environmental streptococci or mixed infections | 23 |
| | | Higher BC for <i>E. coli</i> than for <i>Enterobacter cloacae</i> , lowest BC for <i>Klebsiella</i> spp. (without indication of significance) | 24 |
| | | Significantly higher BC for cases no pathogen or gram-negative pathogens were cultured than cases caused by gram-positive or other pathogens | 21 |
| | | Tendency for higher BC in culture-negative cases than in culture-positive cases | 15 |

Behandling

Gram-positive bacteria, β -lactamas-

First choice Treatment with Penicillin G.*

Second choice Only supportive therapy, no antibiotics.

Gram-positive bacteria, β -lactamas+

First choice Only supportive therapy, no antibiotics.

Second choice Treatment with a β -lactamase resistant antibiotic.*, **

Gram-negative bacteria (E. coli)

First choice Only supportive therapy, no antibiotics.

Second choice Treatment with an antibiotic effective against gram-negative bacteria.*

Nordic guidelines for mastitis treatment, 2011

NSAIDs

Behandling – administrationsvej

- IMM er bedre end IM for behandling af Streptococci (Erskine et al., 1996)
- Der er ikke forskel i “cure rate” mellem IMM og IM behandling af klinisk mastitis (Sandgren et al., 2008; Kalmus et al., 2014)
- IM øger ikke sandsynlighed for helbredelse i forhold til IMM (Krömker et al., 2017)
- Kun ved *Staph. aureus* mastitis er der en klar fordel ved systemisk behandling frem for lokal behandling (Taponen et al., 2003; Barkema et al., 2006)

Behandling – IMM fordele og ulemper

- Høj koncentration i mælk
- Hurtig effekt lokalt
- **Lavere dosis end ved systemisk behandling**
- **Ikke øget risiko for resistens som ved parenteral behandling**
- Undgår irritation ved IM administration
- Risiko for at tilføre bakterier via tube i pattekanal hvis ikke aseptisk administration
- Når ikke dybt i yvervæv og blodbane

Table 1: Where to target antimicrobial therapy in clinical mastitis due to different pathogens (Erskine 2003)

| | Milk/ducts | Udder tissue | Cow |
|---|------------|--------------|-----|
| <i>Streptococcus agalactiae</i> | +++ | --- | --- |
| Other streptococci | +++ | + | --- |
| <i>Staphylococcus aureus</i> | + | +++ | --- |
| Coagulase-negative staphylococci | +++ | --- | --- |
| <i>Arcanobacterium pyogenes</i> (summer mastitis) | --- | ++ | +++ |
| Coliforms | + | -- | +++ |

(Pyörälä, 2009)


Behandling – Behandlingslængde

Table 2. Estimated probabilities of bacteriological cure by pathogen and duration of intramammary treatment used for treatment of clinical mastitis occurring in primiparous and multiparous cows

| Etiology of clinical mastitis | Treatment duration (d) | Bacteriological cure (%) | | Source |
|-------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------|--|
| | | Primiparous | Multiparous | |
| <i>Staphylococcus aureus</i> | 0 | 0.05 | 0.00 | Gillespie et al., 2002; Deluyker et al., 2005; Oliver et al., 2004b |
| | 2 | 0.15 | 0.10 | |
| | 5 | 0.25 | 0.20 | |
| | 8 | 0.40 | 0.35 | |
| Environmental streptococci | 0 | 0.30 | 0.25 | Morin et al., 1998; Deluyker et al., 2005; Hoe and Ruegg, 2005; McDougall et al., 2007 |
| | 2 | 0.60 | 0.55 | |
| | 5 | 0.70 | 0.65 | |
| | 8 | 0.80 | 0.75 | |
| CNS | 0 | 0.60 | 0.55 | Oliver et al., 2004b; Hoe and Ruegg, 2005; McDougall et al., 2007; van den Borne et al., 2010 |
| | 2 | 0.75 | 0.70 | |
| | 5 | 0.80 | 0.75 | |
| | 8 | 0.85 | 0.80 | |
| <i>Escherichia coli</i> | 0 | 0.80 | 0.75 | Wilson et al., 1999; McDougall et al., 2007; Bradley and Green, 2009; van den Borne et al., 2010; Suojala et al., 2010. |
| | 2 | 0.90 | 0.85 | |
| | 5 | 0.90 | 0.85 | |
| | 8 | 0.90 | 0.85 | |
| <i>Klebsiella</i> spp. | 0 | 0.40 | 0.35 | Smith et al., 1985; Pyörälä and Pyörälä, 1998; Roberson et al., 2004; Hoe and Ruegg, 2005 |
| | 2 | 0.50 | 0.45 | |
| | 5 | 0.50 | 0.45 | |
| | 8 | 0.50 | 0.45 | |
| No growth | 0 | 0.95 | 0.90 | Roberson et al., 2004; Pinzón-Sánchez, 2010. |
| | 2 | 0.95 | 0.90 | |
| | 5 | 0.95 | 0.90 | |
| | 8 | 0.95 | 0.90 | |

Helbredelse/Cure

- **Bakteriologisk helbredelse**
- Klinisk helbredelse
- SCC niveau tilbage til udgangspunkt
- Kombination af ovenstående



Nyinfektionsrate - NIR


- Svært at skelne en mislykket behandling fra en ny infektion uden detaljeret viden om det involverede patogen
- 30% kliniske tilfælde vender tilbage med samme species i samme laktation
(Wente et al. 2020)
 - 11% med samme bakteriestamme
 - Forskel i patogen:
 - *Staph. aureus* persisterende
 - *Strep. uberis* mange tilfælde af nyinfektion med anden stamme

Projekt: Yversundhed i top!

REDUCÉR BRUG AF ANTIBIOTIKA

Hvor skal vi sætte ind?

- Hovedfokus: **Strategi for behandling af klinisk mastitis**
 - De "rigtige" køer
 - Den "rigtige" behandling



Hvor bruger vi antibiotika?



Hvor ofte bruger du følgende administrationsveje, ved behandling af klinisk mastitis med antibiotika?

En kombination af lokal og systemisk behandling

36 42 7

Alene systemisk (parenteral) antibiotika

7 10 20 35 13

Alene lokal (intramammær) antibiotika

14 11 31 38


Svarmulighed ■ altid ■ ofte ■ nogle gange ■ sjældent ■ aldrig

Laktationsbehandlinger
Parenteralt?


On-farm test
kan halvere
antal af
behandlinger?

Afprøvning i danske besætninger

- Cases til behandling:
 - Udvælges baseret på kliniske tegn (mild-moderat)
 - On-farm test for at differentiere mellem mastitis og ikke-mastitis
 - Agens vurderes historisk på sterilt udtag
- Randomiseret behandling
 - Alle køer behandles med NSAID: ketoprofen (1 dag)
 - Lokal behandling: Penicillin procain IMM (3 dage)
 - Kombineret behandling: Penicillin procain IMM + pentamathydroiodid IM (3 dage)
- Opfølgning efter 2 og 3 uger
- **Demonstrere at lokal behandling *ikke er værre end* parenteral + lokal behandling i forhold til helbredelse af mild og moderat klinisk mastitis med penicillin-præparater (Non-inferior studium)**



Accept af margin på 15%
15 x reduceret mængde



| Nr. | Dato | Ko nr. | Kirtel | Mastitis grad | Prøve udtaget | OF test start | OF test slut | OF test resultat | Behandling* | Mastitis grad Dag 4 |
|-----|------|--------|--------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------------|-------------|---------------------|
| 31 | | | | 1 2 3 | | | | 0 - + | | 0 1 2 3 |
| 32 | | | | 1 2 3 | | | | 0 - + | | 0 1 2 3 |
| 33 | | | | 1 2 3 | | | | | | 3 |
| 34 | | | | 1 2 3 | | | | | | 3 |
| 35 | | | | 1 2 3 | | | | | | 3 |
| 36 | | | | 1 2 3 | | | | | | 3 |
| 37 | | | | 1 2 3 | | | | | | 3 |
| 38 | | | | 1 2 3 | | | | | | 3 |
| 39 | | | | 1 2 3 | | | | | | 3 |
| 40 | | | | 1 2 3 | | | | | | 3 |

Graduering af mastitis

| | Forandret mælk | Påvirket yver | Syg ko |
|------|---|---|---|
| Grad |  |  |  |
| | Klatter, flager, vandigt, og/eller misfarvet mælk | Hævet, rødt, varmt, hårdt, og/eller ømt yver | Feber > 39,5°C, almen påvirket, nedsat ædeflyst og/eller nedsat ydelse |
| 1 |  | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | Action: 1) mælkeprøve 2) on-farm test 3) smertestillende | | |
| 2 |  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | Action: 1) mælkeprøve 2) on-farm test 3) smertestillende | | |
| 3 |  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | Action: 1) mælkeprøve 2) behndl straks! | | |

Sådan tager vi en mælkeprøve

| | |
|------------------------------------|---|
| Udstyr: | <ul style="list-style-type: none"> - Handsker - Glas - Vat - alkohol  |
| 1) Tag nye handsker på |  |
| 2) Desinficer pattespidsen: | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Put alkohol på et stykke vat ➤ Rengør pattespidsen indtil vattet er helt rent når du fjerner det fra pattespidsen  |
| 3) Malk ud: | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Mindst 3 stråler på gulvet  |
| 4) Tag mælkeprøven: | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Skru låget af og gem det i hånden uden at røre indersiden ➤ Tag mælkeprøven mens glasset vinkles i 45° og holdes 20 cm fra patten ➤ Opsaml 5 ml mælk  <p>VIGTIGT: sæt prøven i køleskab (5°C) indtil on-farm test</p> |
| |  |



Harald nyborg:
28 kr incl. moms

Vejledning til MastDecide On-farm test




1) Klargør mælkeprøve,
pipette, HVID og GUL rør,
tusch, stativ til prøver



2) Tag rene handsker på
3) Skriv nummer på rørene
4) Åbn rørene




5) Vend mælkeprøven et par
gange og tag låget af uden at
røre indersiden af låg eller
glas



6) Fyld pipetten (0,1 ml) uden
at røre prøveglasset med
pipetten




7) Tilsæt mælk til det HVIDE
rør uden at pipetten rører
indersiden eller mediet



8) Gentag med det GULE rør



9) Vend rørene så væskerne
blandes



10) Sæt rørene i varmeskab i
mindst 12 til 14 timer
11) Fry s mælkeprøven

Aflæsning af On-farm test efter 12-14 timer

| Test rør | Test medium 1 (hvidt låg) | Test medium 2 (gult låg) | Test resultat | Behandling | |
|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--|---------------------------------------|
|  | Pink | Pink | Ingen bakterier (0) | Ingen antibiotika  | |
|  | Hvid | Pink | Gram negative bak (-) | Ingen antibiotika  | |
|  | Hvid | Hvid | Gram positive bak (+) | Ulige øremærke → Behandles i kirtlen Lige øremærke → Behandles i kirtel og krop | HUSK AT REGISTRERE RESULTATET! |

Foreløbige resultater

RÅ DATA!

Bakteriologisk cure

- ***Positiv feedback på OF-test!***
- ***Efterspørgsel på "systematik"***
- ***Kliniske registreringer giver overblik***

Reduktion i antal AB behandlinger helt ned til 1/3
-uden umiddelbar negativ effekt på yversundhed
-analyse følger..

Resultater

| No. | Date | Cow ID | Quarter | Mastitis grade | Sample (r) | OF test start (r) | OF test end (r) | OF test result | Treatment* | Mastitis grade Day 4 |
|-----|-------|----------|---------|----------------|------------|-------------------|-----------------|----------------|---------------|----------------------|
| 111 | 24.11 | 5235 MAX | HF | (1) 2 3 | 7:10 | 12:56 | 5:31 | 0 (-) + | — | 0 1 2 3 |
| 112 | 24.11 | 4683 MAX | VF | (1) 2 3 | 8:50 | 12:59 | 5:31 | — | — | 0 1 2 3 |
| 113 | 24.11 | 4683 MAX | HF | (1) 2 3 | 8:51 | 13:00 | 5:32 | — | — | 0 1 2 3 |
| 114 | 24.11 | 4888 MAX | HF | (1) 2 3 | 8:00 | 13:05 | 5:32 | 0 (-) + | — | — |
| 115 | 24.11 | 2674 MAX | HF | (1) 2 3 | 8:10 | 13:07 | 5:33 | 0 (-) (+) | carepen mamyz | 0 1 2 3 |
| 116 | 24.11 | 2674 MAX | HF | (1) 2 3 | 8:11 | 13:08 | 5:33 | 0 (-) + | — | 0 1 2 3 |
| 117 | 24.11 | 2674 MAX | HF | (1) 2 3 | 8:12 | 13:09 | 5:33 | 0 (-) + | — | 0 1 2 3 |
| 118 | 24.11 | 2674 MAX | VF | (1) 2 3 | 20:46 | 23:13 | 13:20 | 0 (-) + | — | 0 1 2 3 |
| 119 | 25.11 | 4367 MAX | HF | (1) 2 3 | 8:20 | 13:14 | 5:36 | 0 (-) + | — | 0 1 2 3 |
| 120 | 25.11 | 4979 MAX | HB | (1) 2 3 | 8:00 | 13:16 | 5:36 | 0 (-) + | — | 0 1 2 3 |

*Odd cow ID (1,3,5,7,9)= Carepen 3d, Even cow ID (0,2,4,6,8)= Carepen+Mamycin 3d, ALL COWS= Dinalgen 1d

The sample should be stored at 5°C BEFORE OF test

80% mild-moderat

35% G+


Knap 500 behandlinger

1800 registreringer



Kliniske yverbetændelser – Gram + på OF test

| Bakterie | Antal | Heraf renkultur |
|-----------------------|-------|-----------------|
| Forurening | 31 | - |
| Strep. uberis | 165 | 130 |
| NAS | 135 | 59 |
| Staph. aureus | 52 | 33 |
| Strep. dysgalactiae | 40 | 26 |
| E. coli | 25 | 12 |
| Strep. agalactiae | 1 | 1 |
| T. pyogenes | 1 | 0 |
| Andet | 81 | 30 |
| Dyrkningsnegativ 10ul | 63 | - |
| Heraf vækst på 100ul | 28 | - |

6 % forurenede prøver defineret ved mere end 2 species



352 cases til cure-beregning



Fund i kliniske tilfælde der er vurderet
helbredelse på


Helbredelse

- Overordnet cure rate (ej korrigert for ko-faktorer, grad, pathogen)


| Behandling | Kureret (%) | Ej kureret (%) | Total |
|------------|-------------|----------------|-------|
| Lokal | 134 (77) | 40 (23) | 174 |
| Kombineret | 148 (83) | 30 (17) | 178 |
| Total | 282 (80) | 70 (20) | 352 |

Helbredelse


Besætningsspecifikt



Helbredelse på bakterie-niveau



Opfølgning på behandlinger



Opfølgningsprøver fra kurerede cases var ikke nødvendigvis sterile..

Behandling af *Streptococcus uberis* mastitis

Margin
overstiger ikke
15 %


**Gennemsnitlig helbredelse for
Strep. Uberis var 80-85 % uanset
om vi anvendte injektion eller ej**


Ko-faktorer, grad, SCC...

Take-home



Besætningsforskelle





Succes-kriterier

- Mælkeprøver skal være steril udtaget
- Konsistens og ansvarlig håndtering
- Faciliteter som kan anvendes til formålet
- Basal forståelse for beslutningsstøtte og kompetencer til at træffe beslutning som går imod testen
- Systematisk opfølgning på relevante prøver i praksislab
- MIC undersøgelse efter behov





Spørgsmål?

Tak til deltagende besætninger og dyrlæger!