

AFGRÆSNING PÅ BARRITSKOV

Svend Daverkosen
Leif Rørbye



Se 'European Agricultural Fund for Rural Development' (EAFRD)

Hvordan kom vi hertil?

- 2000 – Ingen konventionel gødning
- 2001 – Naturplan
- 2003 – Kvier afgræsser
- 2005 – Studene kommer til
- 2007 – Aarstidernes første CO₂-regnskab
- 2009 – Barritskov som Kulstofbinder
- 2011 – Holistisk afgræsning starter

Reguleret Storfold – Kort græs



Holistisk Afgræsning

- Planlagt afgræsning efter hviletid
- Dyrepåvirkning – Trampeeffekt
- Jæger-bytterelation
- Timing
- Belægningsgrad – på gården/pr fold
- Kvægtype eller –race
- 4 Økosystemprocesser

Ny foldinddeling – Mange folde



Vent pænt på næste portion



En kort tur i engen



God græshøjde



For langt eller?



Divers plantesammensætning



Brede blade



Hvor lander regndråben?



Vurdering af genvækst



Trampeeffekt



Nedtrampning



Ukrudtsregulering i Hestefolden



Adfærd og vomfylde



Planlægning, registrering, monitering...



Læring, Læring og Læring!





4 Nøgleindsigter

- Holistisk perspektiv er essentielt i management
- Vandholdende evne centralt for græssystemers sårbarhed
- Dyrene er afgørende for øko-systemets frugtbarhed
- Timing for jorden og planternes påvirkning fra dyr