

Planter

Rust i havre

Det er meldt om angreb af kronrust i enkelte marker, men angrebene er kommet meget sent.

Analyse | 17. august 2020



På det seneste er modtaget enkelte meldinger om mere udbredte angreb af kronrust i havre. Angreb af kronrust kommer oftest på et sent tidspunkt og ses på sent udviklede planter, da smittetrykket stiger gennem sæsonen. De pågældende marker er relativt sene i udviklingen, og angrebene vurderes at være kommet så sent, at de kun har betydet mindre for udbyttet.

I mange marker ses nu også kronrust på grønne enkeltplanter, som står i kanten af høstede eller uhøstede marker.

Som et kuriosum kan nævnes, at der i nogle marker også kan findes sortrust på sent udviklede enkeltplanter i kanten af marken. Sortrust er let at kende, da svampen først og fremmest angriber stængler. Se fotos.

Begge svampe trives bedst ved høje temperaturer og bladfugt.



Foto 1. Kronrust i sentsået havre der stadig er lidt grøn fotograferet 12. august 2020 af Annemette Pagter, Velas.



Foto 2. Nærbillede af kronrust fra samme mark som foto 1 fotograferet 12. august 2020 af Annemette Pagter, Velas. Der ses også sorte vintersporer.



Foto 3. Kronrust i havre fotograferet 4. august 2020 af Jens Lautrup, Landbothy.



Foto4. Nærbillede af kronrust fotograferet 13. august 2020 på grønne enkeltplanter i kanten af en høstklar havremark.




Foto 5. Sortrust på stængler af enkeltplanter i kanten af høstklar havre fotograferet 13. august 2020.



Foto 6. Nærbillede af
sortrust fra samme mark
som foto 5 fotograferet
13. august 2020.

Emneord

[Havre](#)

[Svampebekæmpelse](#)

[Svampesygdomme, planter](#)

Vil du vide mere?



Ghita Cordsen Nielsen

Landskonsulent, Planteværn

SEGES

gcn@seges.dk

+45 8740 5439

Støttet af

STØTTET AF
Promilleafgiftsfonden for landbrug

SEGES
Agro Food Park 15
8200 Aarhus N

Tlf. 87 40 50 00
Fax. 87 40 50 10
Email info@seges.dk

