

[< Tilbage](#)

Planter

Rodgallenematoder i nogle vårbyg- og vårhvedemarker

Der er modtaget henvendelser om angreb fra omkring 15 planteavlskonsulenter. Angreb ses især på let jord.

Viden om Opdateret 06. juli 2020




De seneste uger er der modtaget henvendelser fra omkring 15 planteavlskonsulenter fra forskellige steder i landet om angreb af rodgallenematoder i vårbyg og to tilfælde i vårhvede. Angreb er sjældne, og normalt fås kun 1-2 henvendelser om angreb med 2-3 års mellemrum. Angreb ses især på let jord. Lavt reaktionstal fremmer angreb.

Områdevis i marken er væksten hæmmet, og på rødderne ses karakteristiske galler. Se billeder nedenfor.



Billede 1. Angreb af rodgallenematoder i vårhvede fotograferet 11. juni 2020 af Lars Møller-Christensen, Vestjysk.



Billede 2. Angreb af rodgallenematoder i vårhvede fotograferet 11. juni 2020 af Lars Møller-Christensen, Vestjysk.



Billede 3. Nærbillede af angreb af rodgallenematoder i vårbyg fotograferet 19. maj 2020 af Jens P. Hansen, Agrinord.



Billede 4. Nærbillede af angreb af rodgallenematoder.

Der findes flere arter af rodgallenematoder indenfor slægten *Meloidogyne*. Tidligere er der sendt prøver til artsbestemmelse i Sverige, hvor der har været tale om arten *Meloidogyne naasi*. I år er også sendt nogle prøver til artsbestemmelse, men pt. er ikke modtaget noget svar. Det forventes dog, at der kan være tale om arten *M. naasi*. **OPDATERING:** Der er 6. juli modtaget svar på indsendte prøver, og der er igen i alle tilfælde tale om arten *M. naasi*.

Arten *M. naasi* angriber græsser, især rajgræsser og svingler samt byg, hvede og rug. Løg og roer angribes i mindre omfang. Nogle bælplanter bl.a. rødkløver kan også angribes. Havre, majs og kartofler angives som dårlige værter/ikke værter.

Arten *M. hapla* er også påvist i Danmark, men denne art angriber ikke korn og græs, men angriber bl.a. gulerødder.

Til tider ses også angreb af krogneematoder (*Subanguina radicola*, tidligere navn *Ditylenchus radicolus*) i korn (excl. havre), hvor symptomerne minder om angreb af rodgallenematoder, men ved angreb af krogneematoder har flere af gallerne form som en krog, så de modtagne plantepróver vurderes ikke at være krogneematoder.

Mange af rodgallenematoderne er polyfage, dvs. de har mange værter. Ved at få rodgallenematoderne artsbestemt, kan sædskiftet planlægges. Det angives, at angreb kan holdes nede ved dyrkning af en ikke vært i to sæsoner (flere ukrudtsarter kan dog også være værter).

Ved angreb skal man undgå at få jorden spredt, da smitten sidder i jorden.

Emneord

Skadedyr, planter

Vårbyg

Vårhvede

Sidst bekræftet/revideret: 06. juli 2020

Vil du vide mere?



Ghita Cordsen Nielsen

Landskonsulent, Planteværn

SEGES



gcn@seges.dk
+45 8740 5439

Støttet af

STØTET AF
Promilleafgiftsfonden for landbrug

SEGES	Tlf.	87 40 50 00
Agro Food Park 15	Fax.	87 40 50 10
8200 Aarhus N	Email	info@seges.dk

