

Planter

Synlige angreb af havrerødsot i vinterbyg

Der er set angreb i en vinterbygmark. Det er sjældent, at symptomerne viser sig så tidligt.

Analyse | 25. november 2020



Der er allerede nu set angreb af havrerødsot i en vinterbygmark på Bornholm. Se fotos. En prøve er undersøgt og er positiv for havrerødsot. Marken er sået først i september og er først sprøjtet imod bladlus ca. 20. oktober.

Det er sjældent at se symptomer på havrerødsot så tidligt, men ifølge litteraturen kan det godt forekomme. Normalt bliver angreb først synlig fra omkring februar og løbende i foråret. Der skal selvfølgelig også være et vist angreb, før man opdager symptomerne.



Billede 1. Angreb af havrerødsot i vinterbygmark fotograferet 12. november 2020 af Jacob Dam Nielsen, Bornholms Landbrug.



Billede 2. Nærbillede af samme mark som foto 1 fotograferet 12. november 2020 af Jacob Dam Nielsen, Bornholms Landbrug.

Som bekendt har udviklingen af bladlus igen i dette efterår været fulgt i vinterbyg og hvede i registreringsnettet, og i flere marker har der været mange bladlus. Bekæmpelse er derfor udført i mange hovedsagelig tidligt såede marker i september-oktober og i flere tilfælde også i november. Ved sen bekæmpelse er tærsklen hævet fra 2-3 til 20 procent angrebne planter.



Bekæmpelse på nuværende sene tidspunkt skønnes ikke længere aktuel, da hovedparten af en evt. smitte vil være overført.

Emneord

[Svampebekæmpelse](#)

[Svampesygdomme, planter](#)

[Vinterbyg, vintersæd](#)

Vil du vide mere?



Ghita Cordsen Nielsen

Landskonsulent, Planteværn

SEGES

gcn@seges.dk

+45 8740 5439

Støttet af

Promilleafgiftsfonden for landbrug

Landbrug & Fødevarer F.m.b.A. SEGES

Agro Food Park 15

8200 Aarhus N

Tlf. 87 40 50 00

Fax. 87 40 50 10

Email info@seges.dk

