

Kvæg

Vinterklargøring af græsmarker

Det er nu, at fundamentet for næste års græshøst skal lægges. Sidste slæt bør tages ved førstkommande lejlighed med godt vejr efter 20. september. Det gør det nemmere at opnå passende tørstofindhold i sidste slæt og større udbytte næste år. Hold fokus på stubhøjde, kvælstof- og kaliumforsyning.

Viden om Opdateret 14. september 2020

Sidste slæt tages ved førstkommande lejlighed med godt vejr efter 20. september og helst inden 10. oktober, så græsset kan nå en passende bladmasse inden vinter.

Der er tre faktorer vi kan påvirke, for at sikre græssets overvintring

- Stubhøjde
- Kvælstofforsyning
- Kaliumforsyning

Stubhøjde

For at sikre en tilstrækkelig bladmasse inden vinter skal stubhøjden afpasses tidspunktet for sidste slæt. Høstes sidste slæt i slutningen af september eller starten af oktober er det ofte nemmere at få bjærget sidste slæt med passende tørstofindhold og undgå strukturskader i græsmarken. Her kan stubhøjden med fordel sættes til 7- cm. Udbyttet i første slæt efterfølgende år er typisk størst, hvor foregående sidste slæt er høstet i slutningen af september eller starten af oktober.

Høstes sidste slæt senere end medio oktober bør stubhøjden til gengæld være ca. 10 cm, så græsset efterlades med tilstrækkeligt grønt bladareal.

Græs udlagt i sensommeren er tynd og meget lidt modtagelig for sneskimmel, hvorfor disse marker ikke skal afpudses/høstes, da det ofte giver risiko for spor i marken.

Kvælstofforsyning

Græsset skal være i balance inden vinter – dvs. græsset skal være gået i "dvale" inden vinter – et højt kvælstofniveau i jorden og planterne får planterne til at fortsætte væksten, hvilket øger risikoen for udvintring. Derfor øges risikoen i marker med sen tildeling af større mængder gylle og gamle marker med højt kvælstofindhold i jorden, samt omkring gødnings- og urinpletter i afgrænsningsmarken.

Kaliumforsyning

Kalium virker som "frostvæske" i planterne. Underskud af kalium øger derfor risikoen for udvintring. Der er flere steder høstet meget store græsudbytter. Som tommelfingerregel kan man regne med, at der bortføres 25 kg kali pr. 1000 FEN, der er bortført marken. Er der således høstet 10.000 FEN pr. ha, bør marken løbende være tilført 250 kg kalium pr. ha. Er kalitallet under 5 på grovsandet jord, og der er høstet mere kalium



end der er tilført kan overvintringen forbedres ved at tilføre 50 kg kalium pr. ha umiddelbart efter sidste slæt, hvis det er taget senest medio oktober.

Skema for risikovurdering for udvintring

Risiko for udvintring	Ubetydelig	Betydelig	Stor
Græsarelets alder	Nyt udlæg og arealer i 1. brugsår	2. brugsår	3. brugsår eller ældre
Jordtypen	Lerjord	Lette jordtyper	Sand- og humusjord
Græsarter i blandingen	Strandsvingel, timothe og engsvingel	Alm. rajgræs og rajsvingel	Hybridrajgræs
Græsarelets kondition i efteråret	Har været veltrimmet med en græshøjde på 7-9 cm senest midt i oktober	Græsset har været for langt eller for kort	For højt kvælstofniveau, evt. i kombination med en forkert græshøjde
Barfrost	Diploid alm. rajgræs	Tetraploid alm. rajgræs	
Sneskimmel (Fusarium)	Tetraploid alm. rajgræs	Diploid alm. rajgræs	

Emneord

[Fodergræs](#)
[Slætgræs](#)

Sidst bekræftet/revideret: 14. september 2020

Vil du vide mere?



Torben Spanggaard Frandsen

Specialkonsulent, Grovfoder

SEGES P/S

tsf@seges.dk

+45 8740 6660



Martin Mikkelsen

Landskonsulent, Grovfoder

SEGES

mam@seges.dk

+45 8740 5435



Støttet af

Promilleafgiftsfonden
for landbrug

SEGES	Tlf.	87 40 50 00
Agro Food Park 15	Fax.	87 40 50 10
8200 Aarhus N	Email	info@seges.dk

