

Kvæg, Planter

Analysér af slætgræs 2021

De seneste analyser af frisk græs viser generelt højt proteinindhold og markant lavere sukkerindhold end eksempelvis sidste år. Fordøjeligheden af organisk stof varierer fra 79 til 85, så de tidligste marker skal høstes så snart vejret tillader det.

Analyse | 20. maj 2021



Til kalibrering af slætprognosen udtages der ugentligt planteklip i græsblandingerne 35, 45 og 49 fra hhv. Sjælland, Sønderjylland og Nordjylland. Se analyserne herunder:

Tabel: Analyser af slætgræs

		Afgrødehøjde	Kløverandel	Råprotein	Sukker	NDF	FK org stof	NEL 20
	Prøvetagnings dato	cm	% af tørstof	g pr. kg tørstof	g pr. kg tørstof	g pr. kg tørstof		MJ pr. kg tørstof
Blanding 35								
Nordjylland	03-maj	15	6	215	290	298	86,8	7,50
	10-maj	22	1	247	177	361	84,4	7,22
	17-maj	32	11	227	114	420	84,0	7,10
Sydjylland	03-maj		6	184	298	313	88,0	>7,60
	10-maj	25	14	158	275	346	87,6	7,47
	17-maj	43	9	181	172	406	84,1	7,02
Blanding 45								
Nordjylland	03-maj	20	18	227	256	307	86,5	7,49



		Afgrødehøjde	Kløverandel	Råprotein	Sukker	NDF	FK org stof	NEL 20
	Prøvetagnings dato	cm	% af tørstof	g pr. kg tørstof	g pr. kg tørstof	g pr. kg tørstof		MJ pr. kg tørstof
	10-maj	34	38	240	162	366	84,1	7,17
	17-maj	42	44	266	68	402	81,3	6,86
Syddjylland	03-maj		10	193	259	335	86,0	7,34
	10-maj	30	13	222	171	373	84,8	7,18
	17-maj	40	12	221	122	425	82,3	6,91
Sjælland	03-maj	35	8	139	297	327	87,6	7,42
	10-maj		22	122	276	326	86,3	7,12
	17-maj		10	118	239	339	84,9	7,03
Sjælland	03-maj	41	14	183	268	312	87,6	7,47
	10-maj		16	191	223	350	84,5	7,08
	17-maj		19	180	153	412	81,2	6,73
Blanding 49								
Nordjylland	03-maj	23	7	218	249	354	85,2	7,40
	10-maj	34	5	246	138	404	84,1	7,25
	17-maj	39	9	239	68	466	80,7	6,87
Syddjylland	03-maj		7	197	254	373	86,3	7,57
	10-maj	30	10	217	169	407	84,2	7,21
	17-maj	38	9	211	114	446	82,0	6,94
Sjælland	03-maj	27	17	157	231	381	86,5	7,34
	10-maj		20	164	176	414	82,7	6,82
	17-maj		20	168	123	460	79,1	6,53

Indholdet af sukker er faldet markant gennem perioden som følge af nattemperaturer over 5 grader og dage med relativ lav solindstråling. Dette har samtidigt øget proteinindholdet som gennemsnitligt ligger på cirka 200 g pr. kg tørstof. Samlet set er fordøjeligheden af organisk stof faldet med 2,5 enhed pr. uge, så den varierede fra 79,1 i blanding 49 til 84,9 i blanding 35/45.

1. slæt skal derfor høstes så snart vejret tillader det i strandsvingelrige blandinger som 49 og 50, mens marker med en stor andel af alm. rajgræs som blanding 35 kan vente til efter pinse.

Du kan finde slætprognosen i www.cropmanager.dk.

Kvæg

Tema: Grovfoder til kvæg

Med temaet Grovfoder får du overblik og viden til at producere godt grovfoder til den rigtige pris, hvad enten det drejer sig om græsensilage, helsæd af korn og majs eller om halm og hø.

Emneord

Foderanalyser

Fodergræs

Grovfoder

+1

Vil du vide mere?



Torben Spanggaard Frandsen

Landskonsulent, Grovfoder

SEGES

tsf@seges.dk

+45 8740 6660

Støttet af

Promilleafgiftsfonden for landbrug

Landbrug & Fødevarer F.m.b.A. SEGES

Agro Food Park 15

8200 Aarhus N

Tlf. 87 40 50 00

Fax. 87 40 50 10

Email info@seges.dk

