

Planter

2 svampesprøjtninger under blomstring i raps?

2021 kan godt være et år, hvor der er betaling for 2 behandlinger under blomstring i marker med raps i sædskiftet grundet de usædvanlig mange dage med nedbør.

Viden om



Knoldbægersvamp er den vigtigste svampesygdom i raps. Ved regelmæssig rapsdyrkning vil der i større eller mindre omfang være sklerotier af svampen i jorden. Sklerotierne spirer med såkaldte apothecier, hvorfra der spredes sporer til blade og kronblade, og smitten sker via sporer og nedfaldne kronblade, som ligger på bladene. Nedbør fremmer angreb, både fordi der spirer flere apothecier frem af jorden, og fordi fugt på bladene med nedfaldne kronblade fremmer angreb.

Effekten af en svampebehandling holder sig ca. 2 uger. Da der ligger kronblade på bladene i længere tid, kan der ved usædvanlig gode smittebetingelser være behov for 2 behandlinger under blomstring. Der findes ingen varslingsjeneste, der kan forudsige behovet for svampebekæmpelse under blomstring og dermed heller ingen varslingsjeneste, der kan forudsige behovet for 2 behandlinger under blomstring. 2021 kan godt være et år, hvor der er betaling for 2 behandlinger under blomstring i marker med raps i sædskiftet grundet de usædvanlig mange dage med nedbør. En høj rapspris øger også rentabiliteten.

Se løsninger i [Svampebekæmpelse i vinterraps under blomstring](#). Bemærk, at Propulse og Amistar Gold kun må benyttes 1 gang pr. sæson i raps, og at der maks. må anvendes 1,0 l Pictor Active pr. sæson. For mange midler skal der være min. 14 dage mellem to behandlinger, og sprøjtefristen er vækststadiet 69 (blomstring afsluttet).

Husk også triazolreglerne. 250 g tebuconazol/difenoconazol tæller 100 procent (hvis det kun er anvendt forår ellers tæller tebuconazol hårdere). 100 pct. svarer til 1,25 l Orius Max, 1,56 l Folicur Xpert, 2,0 l Prosaro, 2,0 l Amistar Gold. Se også [Restriktioner i brugen af triazol-svampemidler](#).



Billede 1. Sklerotier, som er spiret med et såkaldt apothecie, hvorfra der spredes sporer til blade og kronblade.



Billede 2. Smitten med knoldbægersvamp sker, hvis der samler sig sporer og fugt på løvblade med nedfaldne kronblade.

Emneord

[Raps](#)[Svampebekæmpelse](#)[Svampesygdomme, planter](#)[+1](#)

Publiceret: 25. maj 2021

Opdateret: 25. maj 2021

Vil du vide mere?



Ghita Cordsen Nielsen

Landskonsulent, Planteværn

SEGES

gcn@seges.dk

+45 8740 5439

Støttet af

Promilleafgiftsfonden for landbrug

Landbrug & Fødevarer F.m.b.A. SEGES

Agro Food Park 15

8200 Aarhus N

Tlf. 87 40 50 00

Fax. 87 40 50 10

Email info@seges.dk

