

Centium 36 CS – godkendelse udvidet til at omfatte bederoer og rødbeder før og efter fremspiring

Miljøstyrelsen har udvidet godkendelsen af ukrudtsmidlet [Centium 36 CS](#) til at omfatte bederoer og rødbeder.

Produktet kan i bederoer enten anvendes umiddelbart efter såning med op til 0,2 liter pr. ha eller efter fremspiring, ligeledes med op til 0,2 liter pr. ha, som kan deles i op til 4 behandlinger. Vælger man at behandle før fremspiring med en reduceret dosering, kan produktet anvendes både før og efter fremspiring, men under alle omstændigheder må der maksimalt anvendes 0,2 liter pr. ha svarende til 72 gram aktivstof pr. ha i løbet af et vækstår.

Centium 36 CS må i bederoer senest anvendes i 8-bladstadiet. Af hensyn til skånsomheden skal roeplanterne have mindst 2 løvblade, når der behandles efter fremspiring.

I rødbeder er produktet ligeledes godkendt med op til 0,2 liter, men udelukkende behandling umiddelbart efter såning.

For begge nye godkendelsesområder gælder, at man af hensyn til skånsomheden over for afgrøden bør tilpasse doseringen af Centium 36 CS således, at der på jordtyper med JB nr. 1-4 maksimalt bør anvendes 0,1 liter pr. ha, mens der på øvrige jordtyper kan anvendes den fulde dosering.

Centium 36 CS og andre clomazon-holdige produkter må maksimalt anvendes hvert 3. år.

Læs flere detaljer om godkendelsen af Centium 36 CS i [Middeldatabasen](#).

12. marts 2021