

Planter

Pas på giftig engbrandbæger i græsmarker

Engbrandbæger er en giftig plante, der er hyppigt forekommende i græsmarker, som især heste er meget følsomme over for. Men også køer er følsomme overfor giftstofferne i engbrandbæger.

Viden om Opdateret Kl. 14:20



Engbrandbæger forekommer talrigt i nogle græsmarker, fortrinsvis på mere ekstensivt dyrkede marker. På brakmarker og udyrkede arealer kan der også forekomme engbrandbæger.

Især heste er følsomme, men køer tåler heller ikke i større mængde de alkaloider, som findes i engbrandbæger. Dyrene vil normalt forsøge at undgå at spise engbrandbæger i marken, da de ikke bryder sig om den bitre smag.

Der er dog også eksempler på afgræssende dyr, som vænner sig til smagen og spiser engbrandbæger, hvorved de får forgiftning med risiko for at dø. Engbrandbæger bør derfor ikke forekomme på arealer til afgræsning eller slæt.

Hø med indhold af engbrandbæger udgør den største risiko for forgiftning. Smagen af brandbæger bliver mindre kraftig i tørret plantemateriale, og dyrene kan derfor ikke så nemt smage det. De har heller ikke mulighed for at sortere det fra.

Læs også: [Giftige planter: Tørre brandbæger er gift for heste](#)



Sådan bekæmper du engbrandbæger

Engbrandbæger kan bekæmpes med ukrudtsbekæmpelse eller ved at rykke planterne op. En kombination vil sikkert også være aktuel.

Hvis du vil bekæmpe engbrandbæger med ukrudtsbekæmpelse er august et godt tidspunkt at bekæmpe førsteårsplanterne af engbrandbæger, som da har en roset.

Der kan anvendes **22,5-30 g Harmony 50 SX + 0,2 l spredemiddel pr. ha**. Vær dog opmærksom på om der er regler i forbindelse med arealerne, som forhindrer anvendelse af planteværnsmidler. På brakarealer, både brak og MFO-brak, samt på MFO-bræmmer, må der ikke anvendes plantebeskyttelsesmidler mod engbrandbæger.

Håndlugning, afslåning og oprykning af engbrandbæger skal ske i begyndelsen af juli før frøsætning, så spredning af nye frø kan undgås. Engbrandbæger blomstrer i juli-august måned.

Det afklippede plantemateriale bør fjernes fra marken, med mindre dyrene kan holdes fra arealet en periode til det afslåede plantemateriale er lejret under græsningshøjde. Engbrandbæger er en uønsket art, som betyder at den gerne må afslås selektivt på brakarealer i forbudsperioden for slåning.

Bemærk, det afslåede plantemateriale må ikke fjernes fra brakarealer, herunder både brak og MFO-brak. På MFO-bræmmer må det afslåede plantemateriale ikke fjernes i forbudsperioden, dvs. fra 1. maj til 31. juli.

Hvis der er mulighed for det, så vil omlægning af græsmarken også virke som effektiv bekæmpelse af engbrandbæger.



Brakmark med blomstrende engbrandbæger i august

Husk også vårbrandbæger

Vårbrandbæger er også giftig, og findes i nogle marker, men indholdet af de skadelige alkaloider er lavere, sammenlignet med engbrandbæger. Vårbrandbæger er tidlig i sin udvikling, og vil blomstre allerede i april-maj. Bekæmpelse kan ske sidst i august med 15-22,5 g Harmony 50 SX + spredeklæbemiddel.

Læs også følgende artikler om engbrandbæger



Emneord

Giftighed

Planteforgiftning

Publiceret: 01. juli 2019

Opdateret: 07. juli 2021

Vil du vide mere?



Marianne Haugaard-Christensen

Landskonsulent, cand.agro.

SEGES

mhg@seges.dk

+45 8740 5403



Poul Henning Petersen

Landskonsulent, Planteværn

SEGES

php@seges.dk

+45 8740 5443



Marian Damsgaard Thorsted

Specialkonsulent, Planteværn

SEGES

mdt@seges.dk

+45 8740 5447

Støttet af

Promilleafgiftsfonden for landbrug

