

Planter

Se efter trips i rug, triticale og vinterbyg lige før begyndende skridning

Tripsene skader ved at suge indvendigt på bladskederne, så de brunfarves. Bekæmp kun ved mere end 0,5-1 trips pr. øverste bladskede, da de opnåede merudbytter for bekæmpelse ofte er lave.

Manual Opdateret Kl. 12:43



Lige før begyndende skridning af rug, triticale og vinterbyg skal marken kontrolleres for angreb af trips. Trips optræder i varmt vejr, og oftest optræder der flest i rug og triticale. Tripsene skader ved at suge indvendigt på bladskederne. Ved kraftige angreb bliver bladskederne og fanebladene brune. Angreb i aksene er ikke særlig tabsvoldende.

Vurdér angrebsstyrken inde i marken, da angreb oftest er kraftigere i randen af marken. Vær opmærksom på, at de sorte trips sidder under bladskederne. Bladskederne skal derfor åbnes, når marken undersøges for evt. tripsangreb. Senere fremkommer tripsenes larver, der er 1-2 mm og hvide eller rødlig.

Bekæmpelse anbefales ved fund af mere end 0,5 -1 mørk trips pr. øverste bladskede på aksbærende strå. Bekæmpelse anbefales ikke ved lavere angrebsgrader, da tripsbekæmpelse oftest kun resulterer i forholdsvis begrænsede merudbytter. For at ramme tripsene inde i bladskederne, skal bekæmpelse udføres lige før begyndende skridning i vækststadium 45, hvor bladskederne åbner sig lidt. Anvend omkring 200 l vand, og sprøjt om morgenen. Tripsene kan også gøre skade senere, men så er det rent sprøjteteknisk ikke muligt at ramme dem.

Følgende pyrethroider og doser kan anvendes til bekæmpelse af trips: 0,15 kg pr. ha Lamdex/Karate 2,5 WG, 0,075 kg Kaiso Sorbie eller 0,1-0,15 l pr. ha Mavrik/Mavrik Vita. Lamdex erstatter Karate 2,5 WG, som det er forbudt at anvende og opbevare pr. 1/7 2021. Mavrik afløser Mavrik Vita, der må anvendes og opbevares indtil 15. juni 2022.

Lamdex/Karate og Kaiso Sorbie må maksimalt anvendes 3 gange hhv. 1 gang pr. vækstsæson, mens Mavrik/Mavrik Vita må anvendes 2 gange om foråret.

Se svenske forsøg med baggrund for bekæmpelsestærsklerne i vintersæd i [Artikel 1746](#).



Billede 1. Trips i triticale. Foto: Finn Olsen, Sønderjysk Landboforening.





[InBillede 2. Trips i udfoldet bladskede i rug.gen tekst i felt]



Billede 3. To larver af trips i bladskede.



Billede 4. Brunfarvede faneblade og bladskeder efter tripsangreb.

Emneord

Afgrøder

Plantebeskyttelse

Planter

+4

Publiceret: 17. april 2019

Opdateret: 07. maj 2021

Vil du vide mere?



Ghita Cordsen Nielsen

Landskonsulent, Planteværn

SEGES

gcn@seges.dk

+45 8740 5439

Støttet af



Landbrug & Fødevarer F.m.b.A. SEGES	Tlf.	87 40 50 00
Agro Food Park 15	Fax.	87 40 50 10
8200 Aarhus N	Email	info@seges.dk

