

Planter, Kvæg

Skadedyr i foder- og energiroer

De fleste foder- og energiroer er bejdsset med Force 20 CS, så vær meget opmærksom på evt. skadedyrsangreb.

Viden om Opdateret Kl. 14:27



De fleste foder- og energiroer er igen i år bejdsset med skadedyrsmidlet Force 20 CS (tefluthrin), selv om der igen i år er givet dispensation til bejdsning af roer med det mere effektive middel Gaucho WS 70 (imidacloprid) under visse betingelser. De fleste avlere af foderroer har fravalgt at bejdse med Gaucho WS 70, fordi det er et krav, at der i de to efterfølgende sæsoner ikke må sås blomstrende eller bi-attractive afgrøder på det pågældende areal, dvs. der må bl.a. ikke sås majs, hestebønner, ærter og kløver. Se yderligere i [Dispensation til bejdsning af roer med Gaucho WS 70](#).

Force 20 CS har desværre kun effekt mod skadedyrsangreb under jorden. Vær derfor lige fra de tidlige vækststadier og frem opmærksom på evt. skadedyrsangreb i foder- og energiroer, som ikke er bejdsset med Gaucho WS 70.

Pirimor og Lamdex/Karate 2,5 WG er godkendt til skadedyrsbekæmpelse i roer. Lamdex afløser Karate, der er forbudt at anvende og opbevare pr. 1/7 2021.

Pirimor må maks. anvendes 1 gang pr. vækstsæson, og Lamdex/Karate 2,5 WG må maks. anvendes 3 gange pr. vækstsæson.

Flere skadedyr kan angribe

Tidligt kan der optræde angreb af trips, runkelroebiller, bedejordlopper, bedefluer, ådselbiller eller tæger (randbehandling), som kan nødvendiggøre bekæmpelse med Lamdex/Karate 2,5 WG.

Nordic Beet Research, NBR angiver de efterfølgende bekæmpelsestærskler baseret på litteraturstudie samt forsøg og erfaringer. Trips, runkelroebiller og bedejordlopper bekæmpes ved 50 procent angrebne planter frem til 4-6 løvbladstadiet. Hvis planterne er hæmmet i vækst, er tærsklen lavere.

Bedefluer bekæmpes ved begyndende minedannelse og æg på halvdelen af planterne frem til 8 løvbladstadiet. Bekæmpelse af 2. og 3. generation bedefluer er kun undtagelsesvis nødvendigt.

Senere skal der især holdes øje med angreb af bedebladlus, som bekæmpes ved begyndende kolonidannelse (mindst 10 bladlus) på 50 procent af planterne.

Ferskenbladlus optræder typisk enkeltvis og er vanskeligere at opdage. De skader ved at overføre virusgulsot, som er meget tabsgivende. Angrebene af virusgulsot har de senere år været svage, men markerne skal tjekkes for evt. angreb, når bejdsning med Gaucho ikke længere udføres.

Ferskenbladlus anbefales bekæmpet ved 1 uvinget bladlus pr. 10 planter og fra 12-16 løvbladstadiet ved 1 uvinget bladlus pr. plante.

Efter midten af juli tillægges angreb af bede- og ferskenbladlus ikke betydning.



0,2-0,25 kg Pirimor anbefales mod bedebbladlus. Pirimor må kun anvendes 1 gang pr. vækstsæson, så det er vigtigt ikke at anvende for lav dosering. Lamdex/Karate har kun meget begrænset effekt mod bladlus. Sprøjt med Pirimor i lunt vejr og ikke når roerne "sover" og anvend min. 250 l vand.

I varme og tørre år kan det være aktuelt at bekæmpe bede- og gammaugler med Lamdex/Karate ved 4-5 små larver pr. plante.



Billede 1. Ådselbiller er et af de skadedyr, som kan angribe roerne i de tidlige vækststadier. Foto: Thomas Harbo, SAGRO.



Billede 2. Ådselbillelarve. Foto: Thomas Harbo, SAGRO.



Billede 3. Ved angreb af trips ses deforme og fortykkede blade. Til tider kan tripsene også suge på kimstænglerne og fremkalde rodbrandsymptomer. Foto: Anne Lisbet Hansen, NBR



Billede 4. Bedebbladlus



Billede 5. Virusgulsot overføres af ferskenbladlus.

Emneord

Bekæmpelse

Fodersukkerroer

Grovfoder

+2

Publiceret: 07. juni 2019

Opdateret: 07. maj 2021

Vil du vide mere?



Ghita Cordsen Nielsen

Landskonsulent, Planteværn

SEGES

gcn@seges.dk

+45 8740 5439

Støttet af

Promilleafgiftsfonden for landbrug

Landbrug & Fødevarer F.m.b.A. SEGES

Agro Food Park 15

8200 Aarhus N

Tlf. 87 40 50 00

Fax. 87 40 50 10

Email info@seges.dk

