

Planter

Svampebekæmpelse i vårhvede

Nogle af vårhvedesorterne er modtagelige for gulrust. Se løsningsforslag.

Viden om Opdateret 27. april 2021



I tabel 1 ses en oversigt over de mest fremavlede vårhvedesorters modtagelighed for gulrust og meldug. I vårhvede skal man især være opmærksom på gulrust i de modtagelige sorter. Det fremgår, at Alondra og Goldspring er mest modtagelig, mens Kapitol og KWS Talisker ikke er modtagelig for gulrust.

Der har typisk været svage til moderate angreb af Septoria, hvorfor der ikke er foretaget en indgruppering af sorternes modtagelighed for denne sygdom. Data for hvedebladplet og brunrust er også meget begrænsede, fordi angreb har været sjældne.

Tabel 1. De mest fremavlede vårhvedesorters modtagelighed for svampesygdomme.

Sort	Meldug (0-3)	Gulrust (0-3)	Dækning gulrust obs parceller, 11 lok. 2020 (maks. angreb)	Bruttomerudbytte svampek., hkg/ha, 5 fs. 2019-2020 (maks. merudb.)
Thorus	3	1	0,01 (0,05)	5,3 (6,6)
Kapitol	1	0	0,0 (0,01)	4,4 (7,2)
Alondra	0	2	5 (15,0)	6,8 (8,1)
Goldspring	2	2	3,8 (10,0)	6,6 (10,1)
KWS Talisker	1	0	0,0 (0,0)	3,5 (7,8)

* 0-3 skala, hvor 3 er meget modtagelig.

Kilde: www.sortinfo.dk





Billede 1. Nogle vårhvedesorter er modtagelige for gulrust.

Bekæmpelsestærskler

Herunder ses hvornår, de forskellige svampesygdomme skal bekæmpes:

- **Meldug** bekæmpes ved over 25 procent angrebne planter i de tidlige vækststadier.
- **Gulrust** bekæmpes i modtagelige sorter ved konstateret forekomst.
- **Brunrust** bekæmpes ved over 25 procent angrebne planter i vækststadium 30-31 (1 knæ udviklet) og herefter ved over 10 procent angrebne planter.
- **Septoria**. Smittetrykket af Septoria er væsentlig lavere i vårhvede end i vinterhvede, og der skal flere dage med nedbør til at udløse en bekæmpelse. Det nøjagtige antal er dog ikke undersøgt. Behovet vurderes ud fra angrebsgraden og nedbørsforholdene. I vækststadium 45-59 (skridning) udløses en bekæmpelse, hvis der er over 10 pro-cent planter med angreb på 3. øverste blad.
- **Hvedebladplet** kan være et problem ved forfrugt hvede og samtidig reduceret jordbearbejdning, mens svampen er mindre hyppig i pløjede marker. Angreb er oftest svagere i vårhvede end i vinterhvede.

Løsningsforslag

I **tabel 2** er vist løsningsforslag ved svampebekæmpelse i vårhvede. Ved aksbeskyttelsen er angivet en lavere indsats end i vinterhvede, og behandlingen er ikke delt. Det skyldes, at smittetrykket af Septoria er lavere i vårhvede, og de opnåede merudbytter for svampebekæmpelse har været lavere.

Hvor der undtagelsesvis er angreb af hvedebladplet, vælges de angivne løsninger med Propulse, hvor dosis både tilpasses smittetrykket af hvedebladplet og evt. gulrust.

Vær opmærksom på, at der som angivet i tabel 2 for mange af løsningerne er begrænsninger på det tilladte antal behandlinger pr. vækstsæson. Af løsningsforslagene ved de sene løsninger fremgår også ved hvilket vækststadium, løsningerne senest må anvendes.

Triazolregler

Ved svampebekæmpelse skal der tages hensyn til triazolreglerne. Der er begrænsninger på den maksimalt tilladte mængde af visse triazoler. Reglerne er omfattet af krydsoverensstemmelse.

Læs nærmere i: [Restriktioner i brugen af triazol-svampemidler](#)

Emneord

[Svampebekæmpelse](#)

[Svampesygdomme, planter](#)

[Vårhvede](#)

Publiceret: 11. april 2019

Opdateret: 27. april 2021

Vil du vide mere?



Ghita Cordsen Nielsen

Landskonsulent, Planteværn

SEGES

gcn@seges.dk

+45 8740 5439

Støttet af

Promilleafgiftsfonden for landbrug

Landbrug & Fødevarer F.m.b.A. SEGES

Agro Food Park 15

8200 Aarhus N

Tlf. 87 40 50 00

Fax. 87 40 50 10

Email info@seges.dk

