

Planter

Registreringsnet uge 11: Angreb af skadegørere i raps

Angrebene af lys bladplet er meget svage i de fleste marker. Der er ingen bladribbesnudebiller i fangbakkerne.

Analyse | 16. marts 2021



2. registrering af lys bladplet

2. registrering er foretaget. Der er fundet angreb af lys bladplet i en trediedel af 32 undersøgte marker (0,1-35 procent angrebne planter), men dækningsprocenterne er meget lave i næsten alle marker (0,05-1 procent dækning). Der er fundet tre marker på Fyn med 10 procent dækning (2 marker) hhv. 5 procent dækning i sorterne Architect og SY Iowa.

Selv om der opnås bedst effekt ved bekæmpelse af svage angreb, anbefales evt. bekæmpelse først, når der er mere vækst i planterne, og der også er noget nyvækst at beskytte. Svampen trives bedst under milde og fugtige forhold.

Bekæmpelse anbefales fra vækststadium 31 (begyndende strækning) ved mere vækst og ved 5 procent angrebne planter.

Til bekæmpelse kan anvendes 0,4-0,5 l Folicur Xpert eller 0,4-0,5 l Prosaro (tilladt, hvis der samtidig er angreb af andre svampe).

2. registrering af bladribbesnudebiller i gule fangbakker

2. tømning af gule fangbakker er foretaget. Fangsterne er fra den forløbne uge.

Der er i lighed med ugen før ikke fundet bladribbesnudebiller i nogen af de 31 vinterrapsmarker med fangbakker. Dette er ikke uventet i betragtning af det kølige vejr i den forløbne uge.

Bladribbesnudebillen er det tidligste skadedyr i rapsen, og tidspunktet for fremkomsten er meget styret af temperaturen. Begyndende flyvning sker på solrige dage ved 11-12 °C. Ved 12 °C og mere end 7 timers solskin eller ved 15 °C og mere end 3 timers solskin optræder de mere talrigt. Bekæmpelse anbefales ved 10-15 bladribbesnudebiller pr. fangbakke, men bekæmpelsestærsklen er ikke sikker. Der er både set tilfælde af små fangster og efterfølgende kraftige angreb og tilfælde af meget store fangster og efterfølgende svage angreb. Årsagen hertil er, at æglægningsintensiteten er meget afhængig af temperaturforholdene. Ved høje temperaturer lægger hver hun flere æg. Fangsterne skal derfor sammenholdes med temperaturdata.

Bekæmpelse af bladribbesnudebiller anbefales kun, såfremt der er udsat gule fangbakker i marken med fangster af bladribbesnudebiller over tærsklen. Der skal samtidig være relativ høje temperaturer.

Godkendte pyrethroider (excl. Mavrik) anbefales til bekæmpelse.

Hvis der samtidig er behov for bekæmpelse af glimmbøsser, skal der anvendes en blanding af to midler, da pyrethroider (excl. Mavrik) ikke har effekt mod glimmbøsser grundet resistensudvikling hos glimmbøsser mod pyrethroider. Mod glimmbøsser anbefales kun Avaunt 150 EC og Mavrik.

[Se registreringer i Registreringsnettet.](#)



Emneord

Bekæmpelse

Plantesygdomme

Registreringsnet/varsling

+2

Vil du vide mere?



Ghita Cordsen Nielsen

Landskonsulent, Planteværn

SEGES

gcn@seges.dk

+45 8740 5439

Støttet af

Promilleafgiftsfonden for landbrug

Landbrug & Fødevarer F.m.b.A. SEGES

Agro Food Park 15

8200 Aarhus N

Tlf. 87 40 50 00

Fax. 87 40 50 10

Email info@seges.dk