

The background of the slide features a close-up photograph of several piglets. The left side of the image is overlaid with a semi-transparent teal filter, while the right side shows the piglets in their natural, warm-toned environment. The piglets are huddled together, with their snouts and eyes visible.

Råmælk i maven hos nyfødte grise - Kan det mærkes?

Ekspertgruppen for Farestaldsmanagement
Den 11. juni 2021

Trine Friis Pedersen

STØTTET AF

Svineafgiftsfonden



Alle pattegrise skal sikres råmælk!

Optimering af råmælksoptag



Aktivitet 1: Forstudier og pilottest



Aktivitet 2: Er metoden til vurdering af pattegrises råmælksoptag repeterbar?



Afprøvning: Strategisk kuldudjævning

Hvornår kan man mærke og scanne om der er mælk i pattegrisens mave? (Fase 1)

Fase 1:

- Pilot 1+2: Hvor scanner og mærker vi? Hvor meget og hvordan mærker vi?
- Pilot 3: Kan en alm. drægtighedsscanner bruges?
- Pilot 4: Hvor mange grise har fostervæske i maven og hvor meget?
- Pilot 5: Hvor længe bliver fostervæsken i pattegrisens mavesæk?
- Pilot 6: Hvor længe efter tildeling kan mælken mærkes?

Fase 2:

- Kan man mærke om grisen har mælk i maven og hvor meget?
 - Tildeling af mælk via sonde ift. grisens størrelse

Hvor ligger maven og hvor scanner vi?




Hvor, hvor meget og hvordan mærker vi?




Skal grisen være stående eller skal den holdes?
Er grisen afslappet eller spænder den?
Har den drukket, dvs. er der noget i tarmene?

Kan en almindelig drægtighedsscanner bruges? (Fostervæske)




Vi kan se forskel på fostervæske og mælk



Fostervæske (gris på 1,5 kg)







Maven 1,5 timer efter fødsel (ingen tildeling af mælk)




Grisene fik 39 mL råmælk pr. kg ~ tildelt over 3 gange på 30 min



Tildeling af råmælk 3 gange



Tildeling af mælk – efter 30, 60, 120 og 180 min



Tildeling af mælk

- 3 timer efter tildeling – lille mave med luft (3/4 luft + 1/4 væske/mælk)



Opsummering

Vi kan mærke

- Men vi kan både mærke luft, fostervæske og mælk
 - Og det mærkes ikke forskelligt
 - Så vi kan komme til at tage forkerte valg

Vi kan scanne

- Lidt besværligt med drægtighedsscanneren
- Med den avanceret scanner er god (nemt at se forskel)

Næste skridt...

Afprøvning

- Kuldudjævning én gang dagligt vs. strategisk kuldudjævning
- Vi skal redde 1 gris pr. kuld
- 400 kuld
- Kender I en god besætning med +2000 søer og som laver kuldudjævning én gang dagligt?

A woman with dark hair, wearing a red long-sleeved shirt and blue overalls, is holding a small, light-colored piglet. The piglet is looking towards the right. The woman's face is partially visible at the top of the frame. The background is a plain, light-colored wall.

Spørgsmål?

TAK og husk!


Vær altid opdateret på den seneste faglige viden

Tilmeld dig **Nyhedsmail** fra
SEGES Svineproduktion på
www.svineproduktion.dk



 facebook.com/SegesSvineproduktion

Sammenhæng mellem fostervæske og grisens størrelse



Sammenhæng mellem fostervæske og grisens størrelse

